

Relatividade Matemática

Ficha 10

A entregar até à aula de Sexta-feira dia 8 de Maio

1. Seja (M, g) uma variedade Lorentziana temporalmente orientada pelo campo vectorial do tipo tempo X . Dada ua função ϕ de classe C^2 seja

$$T_{\mu\nu} = \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} (\partial_\alpha \phi \partial^\alpha \phi + m^2 \phi^2)$$

o tensor energia-momento associado à equação de Klein-Gordon para ϕ , e Y o campo vectorial definido por

$$Y_\mu = T_{\mu\nu} X^\nu.$$

Mostre que:

- (a) $Y = (X \cdot \phi) \operatorname{grad} \phi - \frac{1}{2} (\langle \operatorname{grad} \phi, \operatorname{grad} \phi \rangle + m^2 \phi^2) X$;
 - (b) Y é causal;
 - (c) Y é passado.
2. **(Desigualdade de Sobolev)** Seja Q o cone sólido fechado em \mathbb{R}^n com altura H , ângulo sólido Ω e vértice na origem. Seja $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função decrescente de classe C^∞ com $\psi(r) = 1$ para $r < \frac{H}{3}$ e $\psi(r) = 0$ para $r > \frac{2H}{3}$. Mostre que:
 - (a) Para qualquer função de classe C^∞ $f : Q \rightarrow \mathbb{R}$ e qualquer $k \in \mathbb{N}$ tem-se

$$f(0) = \frac{(-1)^k}{(k-1)!} \int_0^{R(\theta)} r^{k-1} \frac{\partial^k}{\partial r^k} (\psi(r) f(r, \theta)) dr,$$

onde (r, θ) são as habituais coordenadas esféricas em \mathbb{R}^n e $r = R(\theta)$ é a equação da base do cone (aqui $f(r, \theta)$ representa a função f expressa em coordenadas esféricas).

- (b) Existe uma constante C , dependendo de H e Ω , tal que

$$f(0) = C \int_Q r^{k-n} \frac{\partial^k}{\partial r^k} (\psi f).$$

- (c) Para $k > \frac{n}{2}$ temos $|f(0)| \leq C' \|f\|_{H^k(Q)}$, onde a constante C' só depende de H e Ω (será necessário usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz para integrais múltiplos).