

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
Licenciatura em Engenharia Física Tecnológica
Ano Lectivo: 2004/2005

ANÁLISE NUMÉRICA

Formulário

1. Representação de Números e Teoria de Erros

Erro, erro absoluto, erro relativo ($\tilde{x} \approx x$):

$$(i) \quad x \in \mathbb{R} : \quad e_{\tilde{x}} = x - \tilde{x}, \quad |e_{\tilde{x}}|, \quad \delta_{\tilde{x}} = \frac{e_{\tilde{x}}}{x}, \quad |\delta_{\tilde{x}}| \quad (x \neq 0)$$

$$(ii) \quad x \in \mathbb{R}^n : \quad e_{\tilde{x}} = x - \tilde{x}, \quad \|e_{\tilde{x}}\|, \quad \delta_{\tilde{x}} = \frac{e_{\tilde{x}}}{\|x\|}, \quad \|\delta_{\tilde{x}}\| \quad (x \neq 0)$$

Representação de números reais (notação científica):

$$x = \sigma m \beta^t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

(base) $\beta \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$, (sinal) $\sigma \in \{+, -\}$, (expoente) $t \in \mathbb{Z}$

(mantissa) $m = (0.a_1 a_2 \dots)_\beta \in [\beta^{-1}, 1[, \quad a_i \in \{0, 1, \dots, \beta - 1\}, \quad a_1 \neq 0$

Sistema de ponto flutuante:

$$\text{FP}(\beta, n, t_1, t_2) = \{x \in \mathbb{Q} : x = \sigma m \beta^t\} \cup \{0\}$$

$$\beta \in \mathbb{N} \setminus \{1\}, \quad \sigma \in \{+, -\}, \quad t_1 \leq t \leq t_2, \quad t, t_1, t_2 \in \mathbb{Z}$$

$$m = (0.a_1 a_2 \dots a_n)_\beta \in [\beta^{-1}, 1 - \beta^{-n}], \quad a_i \in \{0, 1, \dots, \beta - 1\}, \quad a_1 \neq 0$$

Arredondamentos:

$$x = \sigma(0.a_1 a_2 \dots a_n a_{n+1} \dots)_\beta \times \beta^t \in \mathbb{R}, \quad \text{fl}(x) \in \text{FP}(\beta, n, t_1, t_2)$$

(i) arredondamento por corte:

$$\text{fl}(x) = \sigma(0.a_1 a_2 \dots a_n)_\beta \times \beta^t$$

(ii) arredondamento simétrico (β par):

$$\text{fl}(x) = \begin{cases} \sigma(0.a_1 a_2 \dots a_n)_\beta \times \beta^t, & 0 \leq a_{n+1} < \frac{\beta}{2} \\ \sigma [(0.a_1 a_2 \dots a_n)_\beta + \beta^{-n}] \times \beta^t, & \frac{\beta}{2} \leq a_{n+1} < \beta \end{cases}$$

Erros de arredondamento ($x = \sigma m \beta^t \in \mathbb{R}$, $\tilde{x} = \text{fl}(x) \in \text{FP}(\beta, n, t_1, t_2)$):

(i) arredondamento por corte:

$$|e_{\tilde{x}}| \leq \beta^{t-n}, \quad |\delta_{\tilde{x}}| \leq \beta^{1-n} =: U$$

(ii) arredondamento simétrico:

$$|e_{\tilde{x}}| \leq \frac{1}{2} \beta^{t-n}, \quad |\delta_{\tilde{x}}| \leq \frac{1}{2} \beta^{1-n} =: U$$

(U : unidade de arredondamento do sistema $\text{FP}(\beta, n, t_1, t_2)$)

Algarismo significativo:

$$x = \sigma m 10^t \in \mathbb{R}, \quad \tilde{x} = \sigma(0.a_1 a_2 \dots a_n)_10 \times 10^t \in \text{FP}(10, n, t_1, t_2),$$

a_i é algarismo significativo de \tilde{x} se $|e_{\tilde{x}}| \leq \frac{1}{2} \beta^{t-i}$

Propagação de erros ($x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\tilde{x} \approx x$, $\tilde{\phi} = \text{fl} \circ \phi$):

$$\begin{aligned} e_{\phi(\tilde{x})} &= \phi(x) - \phi(\tilde{x}) \approx \tilde{e}_\phi(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \phi}{\partial x_k}(x) e_{\tilde{x}_k} \\ \delta_{\phi(\tilde{x})} &= \frac{e_{\phi(\tilde{x})}}{\phi(x)} \approx \tilde{\delta}_\phi(x) = \sum_{k=1}^n p_{\phi, x_k}(x) \delta_{\tilde{x}_k}, \quad p_{\phi, x_k}(x) = \frac{x_k \frac{\partial \phi}{\partial x_k}(x)}{\phi(x)} \\ \delta_{\tilde{\phi}(\tilde{x})} &= \frac{\phi(x) - \tilde{\phi}(\tilde{x})}{\phi(x)} \approx \tilde{\delta}_\phi + \delta_{\text{arr}}, \quad \tilde{\delta}_\phi = \sum_{k=1}^n p_{\phi, x_k} \delta_{\tilde{x}_k}, \quad \delta_{\text{arr}} = \sum_{k=1}^m q_k \delta_{\text{arr}_k} \end{aligned}$$

2. Resolução de Equações Não-lineares ($f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$)

Método da bissecção ($f(z) = 0$, $f \in C([a, b])$, $f(a)f(b) < 0$):

$$\begin{aligned} x_{m+1} &= x_m + \frac{b-a}{2^{m+1}} \text{sgn}[f(a)f(x_m)], \quad m = 0, 1, \dots \\ |z - x_m| &\leq \frac{b-a}{2^m}, \quad |z - x_{m+1}| \leq |x_{m+1} - x_m| \end{aligned}$$

Método do ponto fixo ($f(z) = 0 \Leftrightarrow z = g(z)$):

$$(|g(x) - g(y)| \leq L|x - y|, \quad \forall x, y \in I \subset \mathbb{R}, \quad L < 1; \quad g(I) \subset I)$$

$$x_{m+1} = g(x_m), \quad m = 0, 1, \dots$$

$$|z - x_{m+1}| \leq L|z - x_m|, \quad |z - x_m| \leq L^m|z - x_0|$$

$$|z - x_m| \leq \frac{1}{1-L} |x_{m+1} - x_m|, \quad |z - x_{m+1}| \leq \frac{L}{1-L} |x_{m+1} - x_m|$$

$$\begin{aligned}
& |z - x_m| \leq \frac{L^m}{1-L} |x_1 - x_0| \\
\circ \bullet \quad & g'(z) \neq 0, \quad g \in C^1(I), \quad L = \max_{x \in I} |g'(x)| < 1: \\
& z - x_{m+1} = g'(\xi_m)(z - x_m), \quad \xi_m \in \text{int}(z, x_m) \\
& |z - x_{m+1}| \leq L|z - x_m|, \quad |z - x_m| \leq L^m |z - x_0| \\
& \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{|z - x_{m+1}|}{|z - x_m|} = |g'(z)| =: K_\infty^{[1]} \\
\circ \bullet \quad & g^{(r)}(z) = 0, \quad r = 1, \dots, p-1, \quad g^{(p)}(z) \neq 0, \quad p = 2, 3, \dots, \quad g \in C^p(I) \\
& z - x_{m+1} = \frac{1}{p!} (-1)^{p+1} g^{(p)}(\xi_m) (z - x_m)^p, \quad \xi_m \in \text{int}(z, x_m) \\
& |z - x_{m+1}| \leq K_p |x - x_m|^p, \quad |z - x_m| \leq K_p^{\frac{1}{1-p}} \left(K_p^{\frac{1}{p-1}} |z - x_0| \right)^{p^m} \\
& K_p = \frac{1}{p!} \max_{x \in I} |g^{(p)}(x)| \\
& \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{|z - x_{m+1}|}{|z - x_m|^p} = \frac{1}{p!} |g^{(p)}(z)| =: K_\infty^{[p]}
\end{aligned}$$

Método de Newton ($f(z) = 0, \quad f'(z) \neq 0, \quad f \in C^2(I)$):

$$\begin{aligned}
x_{m+1} &= x_m - \frac{f(x_m)}{f'(x_m)}, \quad m = 0, 1, \dots \\
z - x_{m+1} &= -\frac{f''(\xi_m)}{2f'(x_m)} (z - x_m)^2, \quad \xi_m \in \text{int}(z, x_m) \\
|z - x_{m+1}| &\leq K |z - x_m|^2, \quad |z - x_m| \leq \frac{1}{K} (K |z - x_0|)^{2^m} \\
K &= \frac{\max_{x \in I} |f''(x)|}{2 \min_{x \in I} |f'(x)|} \\
\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{|z - x_{m+1}|}{|z - x_m|^2} &= \left| \frac{f''(z)}{2f'(z)} \right| =: K_\infty^{[2]} \\
|z - x_{m+1}| &\leq \frac{c}{1-c} |x_{m+1} - x_m|, \quad \text{se } K |z - x_m| \leq c < 1
\end{aligned}$$

Método de Newton modificado:

$$\begin{aligned}
& (f^{(r)}(z) = 0, \quad r = 0, \dots, p-1, \quad f^{(p)}(z) \neq 0, \quad p = 2, 3, \dots, \quad f \in C^p(I)) \\
& x_{m+1} = x_m - p \frac{f(x_m)}{f'(x_m)}, \quad m = 0, 1, \dots \\
& z - x_{m+1} = -\frac{1}{2} g''(\xi_m) (z - x_m)^2, \quad g(x) = x - p \frac{f(x)}{f'(x)}, \quad \xi_m \in \text{int}(z, x_m)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
|z - x_{m+1}| &\leq K_2 |x - x_m|^2, \quad |z - x_m| \leq \frac{1}{K_2} (K_2 |z - x_0|)^{2^m} \\
K_2 &= \frac{1}{2} \max_{x \in I} |g''(x)| \\
\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{|z - x_{m+1}|}{|z - x_m|^2} &= \frac{1}{2} |g''(z)| = \frac{1}{p} \left| \frac{h'(z)}{h(z)} \right| =: K_\infty^{[2]} \\
\text{onde } h \text{ é tal que } f(x) &= (x - z)^p h(x), \quad h(z) \neq 0
\end{aligned}$$

Método da secante ($f(z) = 0$, $f \in C^2(I)$):

$$\begin{aligned}
x_{m+1} &= x_m - f(x_m) \frac{x_m - x_{m-1}}{f(x_m) - f(x_{m-1})}, \quad m = 1, 2, \dots \\
z - x_{m+1} &= -\frac{f''(\eta_m)}{2f'(\xi_m)} (z - x_m)(z - x_{m-1}), \quad \xi_m, \eta_m \in \text{int}(x_{m-1}, z, x_m) \\
|z - x_{m+1}| &\leq K |z - x_m| |z - x_{m-1}|, \quad K = \frac{\max_{x \in I} |f''(x)|}{2 \min_{x \in I} |f'(x)|} \\
\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{|z - x_{m+1}|}{|z - x_m|^r} &= \left| \frac{f''(z)}{2f'(z)} \right|^{r-1} =: K_\infty^{[r]}, \quad r = \frac{\sqrt{5} + 1}{2} \\
|z - x_{m+1}| &\leq \frac{c}{1 - c} |x_{m+1} - x_m|, \quad \text{se } K|z - x_{m-1}| \leq c < 1
\end{aligned}$$

3. Resolução de Sistemas Lineares ($Ax = b$, $A \in L^n$, $b, x \in \mathbb{R}^n$)

Normas matriciais induzidas por normas vectoriais ($x \in \mathbb{R}^n$, $A \in L^n(\mathbb{R})$):

$$\begin{aligned}
\|x\|_1 &= \sum_{i=1}^n |x_i| & \|x\|_2 &= \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} & \|x\|_\infty &= \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \\
\|A\|_1 &= \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| & \|A\|_2 &= \sqrt{r_\sigma(A^* A)} & \|A\|_\infty &= \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \\
&\text{(norma por coluna)} & & & &\text{(norma por linha)}
\end{aligned}$$

$$r_\sigma(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|, \quad \lambda_1, \dots, \lambda_n : \text{valores próprios de } A$$

Número de condição de uma matriz:

$$\text{cond}_p(A) = \|A\|_p \|A^{-1}\|_p, \quad p = 1, 2, \infty, \quad \text{cond}_*(A) = r_\sigma(A) r_\sigma(A^{-1})$$

Condicionamento de sistemas lineares ($Ax = b$, $\tilde{A}\tilde{x} = \tilde{b}$):

$$\frac{\|\tilde{x} - x\|_p}{\|x\|_p} \leq \frac{\text{cond}_p(A)}{1 - \frac{\|\tilde{A} - A\|_p}{\|A\|_p} \text{cond}_p(A)} \left(\frac{\|\tilde{A} - A\|_p}{\|A\|_p} + \frac{\|\tilde{b} - b\|_p}{\|b\|_p} \right)$$

$$\frac{\|\tilde{A} - A\|_p}{\|A\|_p} \operatorname{cond}_p(A) = \|\tilde{A} - A\|_p \|A^{-1}\|_p < 1, \quad p = 1, 2, \infty$$

Métodos iterativos:

$$x^{(k+1)} = Cx^{(k)} + w, \quad k = 0, 1, \dots$$

$$C = -M^{-1}N, \quad w = M^{-1}b, \quad M + N = A = L + D + U$$

$$\begin{aligned} \|x - x^{(k+1)}\| &\leq c\|x - x^{(k)}\|, & \|x - x^{(k)}\| &\leq c^k\|x - x^{(0)}\| \\ \|x - x^{(k)}\| &\leq \frac{1}{1-c} \|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|, & \|x - x^{(k+1)}\| &\leq \frac{c}{1-c} \|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| \\ \|x - x^{(k)}\| &\leq \frac{c^k}{1-c} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|, & (c = \|C\| < 1) \end{aligned}$$

- Método de Jacobi ($M = D$):

$$x^{(k+1)} = D^{-1} [b - (L + U)x^{(k)}], \quad k = 0, 1, \dots$$

$$\begin{aligned} \|x - x^{(k)}\|_\infty &\leq \mu^k \|x - x^{(0)}\|_\infty \\ \mu &= \max_{1 \leq i \leq n} (\alpha_i + \beta_i), \quad \alpha_i = \sum_{j=1}^{i-1} \left| \frac{a_{ij}}{a_{ii}} \right|, \quad \beta_i = \sum_{j=i+1}^n \left| \frac{a_{ij}}{a_{ii}} \right| \end{aligned}$$

- Método de Gauss-Seidel ($M = D + L$):

$$x^{(k+1)} = D^{-1} (b - Lx^{(k+1)} - Ux^{(k)}), \quad k = 0, 1, \dots$$

$$\begin{aligned} \|x - x^{(k)}\|_\infty &\leq \eta^k \|x - x^{(0)}\|_\infty \\ \eta &= \max_{1 \leq i \leq n} \frac{\beta_i}{1 - \alpha_i}, \quad \alpha_i = \sum_{j=1}^{i-1} \left| \frac{a_{ij}}{a_{ii}} \right|, \quad \beta_i = \sum_{j=i+1}^n \left| \frac{a_{ij}}{a_{ii}} \right| \end{aligned}$$

- Método de Jacobi modificado ($M = \frac{D}{\omega}$, $\omega \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$):

$$x^{(k+1)} = (1 - \omega)x^{(k)} + \omega D^{-1} [b - (L + U)x^{(k)}], \quad k = 0, 1, \dots$$

- Método de Gauss-Seidel modificado ou SOR ($M = \frac{D}{\omega} + L$, $\omega \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$):

$$x^{(k+1)} = (1 - \omega)x^{(k)} + \omega D^{-1} (b - Lx^{(k+1)} - Ux^{(k)}), \quad k = 0, 1, \dots$$

4. Resolução de Sistemas Não-lineares ($f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$)

Método do ponto fixo ($f(z) = 0 \Leftrightarrow z = g(z)$):

$$\begin{aligned} &(|g(x) - g(y)| \leq L|x - y|, \quad \forall x, y \in D \subset \mathbb{R}^n, \quad L < 1; \quad g(D) \subset D) \\ &\left(g \in C^1(D), \quad L = \sup_{x \in D} \|J_g(x)\| \right) \\ &x^{(m+1)} = g(x^{(m)}), \quad m = 0, 1, \dots \\ &\|z - x^{(m+1)}\| \leq L\|z - x^{(m)}\|, \quad \|z - x^{(m)}\| \leq L^m\|z - x^{(0)}\| \\ &\|z - x^{(m)}\| \leq \frac{1}{1-L}\|x^{(m+1)} - x^{(m)}\|, \quad \|z - x^{(m+1)}\| \leq \frac{L}{1-L}\|x^{(m+1)} - x^{(m)}\| \\ &\|z - x^{(m)}\| \leq \frac{L^m}{1-L}\|x^{(1)} - x^{(0)}\| \end{aligned}$$

Método de Newton generalizado ($f(z) = 0$, $f \in C^2(D)$, $\det[J_f(z)] \neq 0$):

$$\begin{aligned} &\begin{cases} x^{(m+1)} = x^{(m)} + \Delta x^{(m)}, \\ J_f(x^{(m)})\Delta x^{(m)} = -f(x^{(m)}), \end{cases} \quad m = 0, 1, \dots \\ &\|z - x^{(m+1)}\| \leq K\|z - x^{(m)}\|^2, \quad \|z - x^{(m)}\| \leq \frac{1}{K} (K\|z - x^{(0)}\|)^{2^m} \\ &K = \frac{M_2}{2M_1} \begin{cases} \frac{1}{M_1} = \sup_{x \in D} \|[J_f(x)]^{-1}\|, \\ M_2 = \max_{1 \leq i \leq n} \sup_{x \in D} \|H_{f_i}(x)\|, \quad H_{f_i} \in L^n, \quad (H_{f_i})_{jk} = \frac{\partial^2 f_i}{\partial x_j \partial x_k} \end{cases} \end{aligned}$$

5. Interpolação Polinomial

Fórmula interpoladora de Lagrange:

$$p_n(x) = \sum_{j=0}^n f_j l_j(x), \quad l_j(x) = \prod_{i=0, i \neq j}^n \frac{x - x_i}{x_j - x_i}$$

Fórmula interpoladora de Newton:

$$p_n(x) = f[x_0] + \sum_{j=1}^n f[x_0, \dots, x_j] \prod_{i=0}^{j-1} (x - x_i), \quad f[x_0, \dots, x_j] = \sum_{l=0}^j \frac{f(x_l)}{\prod_{i=0, i \neq l}^j (x_l - x_i)}$$

$$\begin{cases} f[x_0, x_1, \dots, x_j] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_j] - f[x_0, x_1, \dots, x_{j-1}]}{x_j - x_0}, \quad j = 2, 3, \dots, \\ f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} \end{cases}$$

Fórmula do erro:

$$e_n(x) = f(x) - p_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} W_{n+1}(x) = f[x_0, \dots, x_n, x] W_{n+1}(x)$$

$$W_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i), \quad \xi \in \text{int}(x_0, \dots, x_n, x)$$

6. Teoria da Aproximação

Melhor aproximação uniforme ϕ^* de $f \in E$ em $F \subset E$, F subespaço de dimensão n , $E = \overline{C([a, b])}$, espaço normado com a norma uniforme:

$$\|f - \phi^*\|_\infty = \inf_{\phi \in F} \|f - \phi\|_\infty \Leftrightarrow \exists x_0 < x_1 < \dots < x_n \text{ em } [a, b] \text{ tais que}$$

$$f(x_i) - \phi^*(x_i) = (-1)^i \delta, \quad i = 0, \dots, n, \quad |\delta| = \|f - \phi^*\|_\infty$$

Melhor aproximação mínimos quadrados ϕ^* de $f \in E$ em $F \subset E$, F subespaço de dimensão n gerado por $\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}$, E espaço pré-Hilbertiano:

$$\|f - \phi^*\|_2 = \inf_{\phi \in F} \|f - \phi\|_2 \Leftrightarrow \langle f - \phi^*, \phi \rangle = 0, \quad \forall \phi \in F$$

$$\phi^* = \sum_{k=0}^n a_k^* \varphi_k, \quad a_k^* = \sum_{j=0}^n (M^{-1})_{kj} \langle f, \varphi_j \rangle, \quad M \in L^n, \quad M_{jk} = \langle \varphi_j, \varphi_k \rangle$$

$$\phi^* = \sum_{k=0}^n a_k^* \varphi_k, \quad a_k^* = \frac{\langle f, \varphi_k \rangle}{\langle \varphi_k, \varphi_k \rangle}, \quad \text{se } \{\varphi_0, \dots, \varphi_n\} \text{ é um sistema ortogonal}$$

Polinómios ortogonais com respeito ao produto interno

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b w(x) f(x) g(x) dx, \quad (f, g \in C([a, b]), \quad w \in C([a, b]), \quad w(x) \geq 0)$$

• Fórmula de recorrência:

$$\begin{cases} \varphi_{n+1}(x) = (x - B_{n+1}) \varphi_n(x) - C_{n+1} \varphi_{n-1}(x), & n = 1, 2, \dots \\ \varphi_0(x) = 1, \quad \varphi_1(x) = x - B_1 \end{cases}$$

$$B_{n+1} = \frac{\langle x \varphi_n, \varphi_n \rangle}{\langle \varphi_n, \varphi_n \rangle}, \quad n = 0, 1, \dots, \quad C_{n+1} = \frac{\langle x \varphi_n, \varphi_{n-1} \rangle}{\langle \varphi_{n-1}, \varphi_{n-1} \rangle}, \quad n = 1, 2, \dots$$

• Polinómios de Legendre, P_n ($x \in [a, b] = [-1, 1]$, $w(x) = 1$):

$$\begin{cases} P_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1} x P_n(x) - \frac{n}{n+1} P_{n-1}(x), & n = 1, 2, \dots \\ P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x \end{cases}$$

- $P_n(x) = \frac{(-1)^n}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(1-x^2)^n], \quad n = 1, \dots$
- $\langle P_n, P_m \rangle = 0, \quad \forall n \neq m, \quad \langle P_n, P_n \rangle = \frac{2}{2n+1}, \quad n = 0, 1, \dots$
- Polinómios de Chebyshev, $T_n \quad (x \in [a, b] = [-1, 1], \quad w(x) = 1/\sqrt{1-x^2})$:
- $$\begin{cases} T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), & n = 1, 2, \dots \\ T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x \end{cases}$$
- $T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad n = 0, 1, \dots$
- $\langle T_n, T_m \rangle = 0, \quad \forall n \neq m, \quad \langle T_0, T_0 \rangle = \pi, \quad \langle T_n, T_n \rangle = \frac{\pi}{2}, \quad n = 1, 2, \dots$
- $T_n(x_i) = 0, \quad x_i = \cos \frac{(2i+1)\pi}{2n}, \quad i = 0, \dots, n-1, \quad n = 1, 2, \dots$

7. Integração

Fórmulas de Newton-Cotes fechadas de ordem n ($f \in C([a, b])$):

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx \approx I_n(f) = \sum_{j=0}^n w_{j,n} f(x_{j,n})$$
 $I_n(x^k) = I(x^k), \quad k = 0, 1, \dots, n$
 $x_{j,n} = a + jh, \quad j = 0, 1, \dots, n, \quad h = \frac{b-a}{n}$
 $w_{j,n} = I(l_{j,n}) = \frac{h(-1)^{n-j}}{j!(n-j)!} \int_0^n \prod_{i=0, i \neq j}^n (t-i) dt, \quad w_{j,n} = w_{n-j,n}$
 $E_n(f) = I(f) - I_n(f) = C_n h^{n+1+\nu} f^{(n+\nu)}(\xi)$
 $C_n = \frac{1}{(n+\nu)!} \int_0^n t^{\nu-1} \prod_{i=0}^n (t-i) dt, \quad \nu = 1 + \frac{1}{2} [1 + (-1)^n], \quad \xi \in (a, b)$

- $n = 1, h = b - a$ (Regra dos trapézios):

$I_1(f) = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)], \quad E_1(f) = -\frac{h^3}{12} f''(\xi), \quad \xi \in (a, b)$

- $n = 2, h = \frac{b-a}{2}$ (Regra de Simpson):

$I_2(f) = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right], \quad E_2(f) = -\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi)$

- $n = 3, h = \frac{b-a}{3}$ (Regra dos três oitavos):

$I_3(f) = \frac{b-a}{8} [f(a) + 3f(a+h) + 3f(b-h) + f(b)], \quad E_3(f) = -\frac{3h^5}{80} f^{(4)}(\xi)$

- $n = 4, h = \frac{b-a}{4}$ (Regra de Milne):

$$I_4(f) = \frac{b-a}{90} \left[7f(a) + 32f(a+h) + 12f\left(\frac{a+b}{2}\right) + 32f(b-h) + 7f(b) \right]$$

$$E_4(f) = -\frac{8h^7}{945} f^{(6)}(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

- $n = 5, h = \frac{b-a}{5}$:

$$I_5(f) = \frac{b-a}{288} [19f(a) + 75f(a+h) + 50f(a+2h) + 50f(b-2h) + 75f(b-h) + 19f(b)]$$

$$E_5(f) = -\frac{275h^7}{12096} f^{(6)}(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

- $n = 6, h = \frac{b-a}{6}$ (Regra de Weddle):

$$I_6(f) = \frac{b-a}{840} \left[41f(a) + 216f(a+h) + 27f(a+2h) + 272f\left(\frac{a+b}{2}\right) + 27f(b-2h) + 216f(b-h) + 41f(b) \right]$$

$$E_6(f) = -\frac{9h^9}{1400} f^{(8)}(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

Fórmulas de Newton-Cotes abertas de ordem n :

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx \approx I_n(f) = \sum_{j=0}^n w_{j,n} f(x_{j,n})$$

$$I_n(x^k) = I(x^k), \quad k = 0, 1, \dots, n$$

$$x_{j,n} = a + (j+1)h, \quad j = 0, 1, \dots, n, \quad h = \frac{b-a}{n+2}$$

$$w_{j,n} = I(l_{j,n}) = \frac{h(-1)^{n-j}}{j!(n-j)!} \int_{-1}^{n+1} \prod_{i=0, i \neq j}^n (t-i) dt, \quad w_{j,n} = w_{n-j,n}$$

$$E_n(f) = I(f) - I_n(f) = C_n h^{n+1+\nu} f^{(n+\nu)}(\xi)$$

$$C_n = \frac{1}{(n+\nu)!} \int_{-1}^{n+1} t^{\nu-1} \prod_{i=0}^n (t-i) dt, \quad \nu = 1 + \frac{1}{2} [1 + (-1)^n], \quad \xi \in (a, b)$$

- $n = 0, h = \frac{b-a}{2}$ (Regra do ponto médio):

$$I_0(f) = (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right), \quad E_0(f) = \frac{h^3}{3} f''(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

- $n = 1, h = \frac{b-a}{3}$:

$$I_1(f) = \frac{b-a}{2} [f(a+h) + f(b-h)], \quad E_1(f) = \frac{3h^3}{4} f''(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

- $n = 2, h = \frac{b-a}{4}$:

$$I_2(f) = \frac{b-a}{3} \left[2f(a+h) - f\left(\frac{a+b}{2}\right) + 2f(b-h) \right]$$

$$E_2(f) = \frac{14h^5}{45} f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

Fórmulas de Newton-Cotes fechadas compostas:

$$x_j = a + jh_M, \quad j = 0, 1, \dots, M, \quad h_M = \frac{b-a}{M}, \quad f_j := f(x_j)$$

- $n = 1$:

$$I_1^{(M)}(f) = \frac{h_M}{2} \left[f_0 + f_M + 2 \sum_{j=1}^{M-1} f_j \right]$$

$$E_1^{(M)}(f) = -\frac{b-a}{12} h_M^2 f''(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

- $n = 2$ (M par):

$$I_2^{(M)}(f) = \frac{h_M}{3} \left[f_0 + f_M + 4 \sum_{j=1}^{M/2} f_{2j-1} + 2 \sum_{j=1}^{M/2-1} f_{2j} \right]$$

$$E_2^{(M)}(f) = -\frac{b-a}{180} h_M^4 f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

- $n = 3$ (M múltiplo de 3):

$$I_3^{(M)}(f) = \frac{3h_M}{8} \left[f_0 + f_M + 2 \sum_{j=1}^{M/3-1} f_{3j} + 3 \sum_{j=1}^{M/3} (f_{3j-1} + f_{3j-2}) \right]$$

$$E_3^{(M)}(f) = -\frac{b-a}{80} h_M^4 f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

- $n = 4$ (M múltiplo de 4):

$$I_4^{(M)}(f) = \frac{4h_M}{90} \left[7(f_0 + f_M) + 14 \sum_{j=1}^{M/4-1} f_{4j} + 32 \sum_{j=1}^{M/4} (f_{4j-1} + f_{4j-3}) + 12 \sum_{j=1}^{M/4} f_{4j-2} \right]$$

$$E_4^{(M)}(f) = -\frac{2(b-a)}{945} h_M^6 f^{(6)}(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

- $n = 5$ (M múltiplo de 5):

$$\begin{aligned} I_5^{(M)}(f) &= \frac{5h_M}{288} \left[19(f_0 + f_M) + 38 \sum_{j=1}^{M/5-1} f_{5j} \right. \\ &\quad \left. + 75 \sum_{j=1}^{M/5} (f_{5j-1} + f_{5j-4}) + 50 \sum_{j=1}^{M/5} (f_{5j-2} + f_{5j-3}) \right] \\ E_5^{(M)}(f) &= -\frac{55(b-a)}{12096} h_M^6 f^{(6)}(\xi), \quad \xi \in (a, b) \end{aligned}$$

- $n = 6$ (M múltiplo de 6):

$$\begin{aligned} I_6^{(M)}(f) &= \frac{h_M}{140} \left[41(f_0 + f_M) + 82 \sum_{j=1}^{M/6-1} f_{6j} + 216 \sum_{j=1}^{M/6} (f_{6j-1} + f_{6j-5}) \right. \\ &\quad \left. + 27 \sum_{j=1}^{M/6} (f_{6j-2} + f_{6j-4}) + 272 \sum_{j=1}^{M/6} f_{6j-3} \right] \\ E_6^{(M)}(f) &= -\frac{3(b-a)}{2800} h_M^8 f^{(8)}(\xi), \quad \xi \in (a, b) \end{aligned}$$

Fórmulas de Newton-Cotes abertas compostas:

$$x_j = a + jh_M, \quad j = 0, 1, \dots, M, \quad h_M = \frac{b-a}{M}, \quad f_j := f(x_j)$$

- Regra do ponto médio composta (M par):

$$I_0^{(M)}(f) = 2h_M \sum_{j=1}^{M/2} f_{2j-1}, \quad E_0^{(M)}(f) = \frac{(b-a)h_M^2}{6} f''(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

Fórmulas de Gauss:

$$I(f) = \int_a^b w(x)f(x)dx \approx I_n(f) = \sum_{j=0}^n w_{j,n} f(x_{j,n})$$

$$I_n(x^k) = I(x^k), \quad k = 0, 1, \dots, 2n+1$$

$x_{j,n}$, $j = 0, 1, \dots, n$: zeros do polinómio Φ_{n+1} de grau $n+1$ pertencente ao sistema $\{\Phi_0, \Phi_1, \dots\}$ de polinómios móbicos ortogonais com respeito ao produto interno $\langle f, g \rangle = I(fg)$.

$$\begin{aligned} w_{j,n} = I(l_{j,n}) &= I(l_{j,n}^2) = -\frac{\langle \Phi_{n+1}, \Phi_{n+1} \rangle}{\Phi'_{n+1}(x_{j,n})\Phi_{n+2}(x_{j,n})}, \quad j = 0, 1, \dots, n \\ E_n(f) &= \frac{\langle \Phi_{n+1}, \Phi_{n+1} \rangle}{(2n+2)!} f^{(2n+2)}(\xi), \quad \xi \in (a, b) \end{aligned}$$

- Fórmulas de Gauss-Legendre ($[a, b] = [-1, 1]$, $w(x) \equiv 1$):

$x_{j,n}, \ j = 0, 1, \dots, n$: zeros do polinómio de Legendre P_{n+1}

$$w_{j,n} = -\frac{2}{(n+2)P'_{n+1}(x_{j,n})P_{n+2}(x_{j,n})}, \quad j = 0, 1, \dots, n$$

$$E_n(f) = \frac{2^{2n+3}[(n+1)!]^4}{(2n+3)[(2n+2)!]^3} f^{(2n+2)}(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

• $I_0(f) = 2f(0)$

• $I_1(f) = f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

• $I_2(f) = \frac{5}{9}f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9}f(0) + \frac{5}{9}f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)$

• $I_3(f) = w_{0,3}f(x_{0,3}) + w_{1,3}f(x_{1,3}) + w_{2,3}f(x_{2,3}) + w_{3,3}f(x_{3,3})$

$$x_{0,3} = -\sqrt{\frac{1}{7}\left(3 + 2\sqrt{\frac{6}{5}}\right)} = -x_{3,3}, \quad x_{1,3} = -\sqrt{\frac{1}{7}\left(3 - 2\sqrt{\frac{6}{5}}\right)} = -x_{2,3}$$

$$w_{0,3} = \frac{1}{6}\left(3 - \sqrt{\frac{5}{6}}\right) = w_{3,3}, \quad w_{1,3} = \frac{1}{6}\left(3 + \sqrt{\frac{5}{6}}\right) = w_{2,3}$$

• Fórmulas de Gauss-Chebyshev ($[a, b] = [-1, 1]$, $w(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$):

$$x_{j,n} = \cos\left(\frac{2j+1}{2n+2}\pi\right), \quad w_{j,n} = \frac{\pi}{n+1}, \quad j = 0, 1, \dots, n$$

$$E_n(f) = \frac{\pi}{2^{2n+1}(2n+2)!} f^{(2n+2)}(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

• Fórmulas de Gauss-Legendre compostas:

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx \approx I_n^{(M)}(f) = \frac{h_M}{2} \sum_{j=0}^n w_{j,n} \sum_{m=1}^M f\left(x_{j,n}^{(m)}\right)$$

$$x_{j,n}^{(m)} = a + h_M(m-1) + \frac{h_M}{2}(x_{j,n} + 1), \quad h_M = \frac{b-a}{M}$$

$$E_n^{(M)}(f) = \frac{b-a}{2} \left(\frac{h_M}{2}\right)^{2n+2} \frac{2^{2n+3}[(n+1)!]^4}{(2n+3)[(2n+2)!]^3} f^{(2n+2)}(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

9. Resolução de Equações Diferenciais Ordinárias: Problemas de Valor Inicial

$$\begin{cases} y'(x) = f(x, y(x)) \\ y(x_0) = Y_0 \end{cases}$$

$$f : D \subset \mathbb{R}^{1+M} \rightarrow \mathbb{R}^M, \quad D \text{ aberto}, \quad M \in \mathbb{Z}^+$$

$$\begin{aligned} f \in C(D), \quad & |f(x, y) - f(x, z)| \leq L|y - z|, \quad \forall (x, y), (x, z) \in D \\ & (x_0, Y_0) \in D \end{aligned}$$

Métodos de passo simples:

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + h \varphi(x_n, y_n; h) \\ x_n &= x_0 + nh, \quad n = 0, 1, \dots, N, \quad N \in \mathbb{Z}^+ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi : D \times]0, \infty[&\rightarrow \mathbb{R}^M, \quad \varphi \in C(D \times]0, \infty[) \\ |\varphi(x, y; h) - \varphi(x, z; h)| &\leq K|y - z|, \quad \forall (x, y; h), (x, z; h) \in D \times]0, \infty[\end{aligned}$$

- Erro de discretização local:

$$\tau(x, y; h) = \frac{1}{h} [Y(x + h) - Y(x)] - \varphi(x, y; h), \quad Y(x) = y$$

- Erro de discretização global:

$$\begin{aligned} \|Y(x_n) - y_n(h)\| &\leq e^{K(x_n - x_0)} \|Y(x_0) - y_0(h)\| + \frac{\tau(h)}{K} [e^{K(x_n - x_0)} - 1] \\ \tau(h) &= \max_{0 \leq n \leq N} \|\tau(x_n, Y(x_n); h)\| \end{aligned}$$

- Método de Euler:

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + hf(x_n, y_n) \\ \tau(x, y; h) &= \frac{h}{2} (Df)(x, y) + \mathcal{O}(h^2) \\ (Df)(x, y) &= \left(\frac{\partial}{\partial x} + f(x, y) \cdot \nabla_y \right) f(x, y) \end{aligned}$$

- Métodos de Taylor de ordem p :

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + h \sum_{j=0}^{p-1} \frac{h^j}{(j+1)!} (D^j f)(x_n, y_n) \\ \tau(x, y; h) &= \frac{h^p}{(p+1)!} (D^p f)(x, y) + \mathcal{O}(h^{p+1}) \end{aligned}$$

- Métodos de Runge-Kutta de ordem 2:

$$\begin{aligned} \varphi(x, y; h) &= (1 - \gamma)f(x, y) + \gamma f \left(x + \frac{h}{2\gamma}, y + \frac{h}{2\gamma} f(x, y) \right) \\ \tau(x, y; h) &= \frac{h^2}{6} \left[D^2 f(x, y) - 3 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial h^2}(x, y; 0) \right] + \mathcal{O}(h^3) \end{aligned}$$

- Método de Euler modificado ou do ponto médio ($\gamma = 1$):

$$y_{n+1} = y_n + hf \left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} f(x_n, y_n) \right)$$

- Método de Runge-Kutta clássico de ordem 2 ($\gamma = \frac{3}{4}$):

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{4} \left[f(x_n, y_n) + 3f \left(x_n + \frac{2h}{3}, y_n + \frac{2h}{3} f(x_n, y_n) \right) \right]$$

- Método de Heun ($\gamma = \frac{1}{2}$):

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_n + h, y_n + hf(x_n, y_n))]$$

- Métodos de Runge-Kutta de ordem 3:

$$\varphi(x, y; h) = \sum_{j=1}^3 \gamma_j \varphi_j(x, y; h)$$

$$\varphi_1(x, y; h) = f(x, y)$$

$$\varphi_j(x, y; h) = f \left(x + \alpha_j h, y + h \sum_{i=1}^{j-1} \beta_{ji} \varphi_i(x, y; h) \right), \quad j = 2, 3$$

$$\tau(x, y; h) = \frac{h^3}{24} \left[D^3 f(x, y) - 4 \frac{\partial^3 \varphi}{\partial h^3}(x, y; 0) \right] + \mathcal{O}(h^4)$$

- Método de Runge-Kutta clássico de ordem 3

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} [\varphi_1 + 4\varphi_2 + \varphi_3]$$

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= f(x_n, y_n), & \varphi_2 &= f \left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} \varphi_1 \right) \\ \varphi_3 &= f(x_n + h, y_n - h\varphi_1 + 2h\varphi_2) \end{aligned}$$

- Método de Runge-Kutta-Nystrom de ordem 3

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{8} [2\varphi_1 + 3\varphi_2 + 3\varphi_3]$$

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= f(x_n, y_n), & \varphi_2 &= f \left(x_n + \frac{2h}{3}, y_n + \frac{2h}{3} \varphi_1 \right) \\ \varphi_3 &= f \left(x_n + \frac{2h}{3}, y_n + \frac{2h}{3} \varphi_2 \right) \end{aligned}$$

- Método de Heun de ordem 3

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{4} [\varphi_1 + 3\varphi_3]$$

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= f(x_n, y_n), & \varphi_2 &= f \left(x_n + \frac{h}{3}, y_n + \frac{h}{3} \varphi_1 \right) \\ \varphi_3 &= f \left(x_n + \frac{2h}{3}, y_n + \frac{2h}{3} \varphi_2 \right) \end{aligned}$$

- Métodos de Runge-Kutta de ordem 4:

$$\varphi(x, y; h) = \sum_{j=1}^5 \gamma_j \varphi_j(x, y; h)$$

$$\varphi_1(x, y; h) = f(x, y)$$

$$\varphi_j(x, y; h) = f \left(x + \alpha_j h, y + h \sum_{i=1}^{j-1} \beta_{ji} \varphi_i(x, y; h) \right), \quad j = 2, 3, 4, 5$$

$$\tau(x, y; h) = \frac{h^4}{120} \left[D^4 f(x, y) - 5 \frac{\partial^4 \varphi}{\partial h^4}(x, y; 0) \right] + \mathcal{O}(h^5)$$

- Método de Runge-Kutta clássico de ordem 4:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} [\varphi_1 + 2\varphi_2 + 2\varphi_3 + \varphi_4]$$

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= f(x_n, y_n), & \varphi_2 &= f \left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} \varphi_1 \right) \\ \varphi_3 &= f \left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} \varphi_2 \right), & \varphi_4 &= f(x_n + h, y_n + h\varphi_3) \end{aligned}$$

- Método de Runge-Kutta-Gill de ordem 4:

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6} [\varphi_1 + (2 - \sqrt{2})\varphi_2 + (2 + \sqrt{2})\varphi_3 + \varphi_4] \\ \varphi_1 &= f(x_n, y_n), & \varphi_2 &= f \left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} \varphi_1 \right) \\ \varphi_3 &= f \left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{\sqrt{2} - 1}{2} h\varphi_1 + \frac{2 - \sqrt{2}}{2} h\varphi_2 \right) \\ \varphi_4 &= f \left(x_n + h, y_n - \frac{\sqrt{2}}{2} h\varphi_2 + \frac{2 + \sqrt{2}}{2} h\varphi_3 \right) \end{aligned}$$

- Método de Runge-Kutta-Fehlberg de ordem 4:

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + h \left[\frac{25}{216} \varphi_1 + \frac{1408}{2565} \varphi_3 + \frac{2197}{4104} \varphi_4 - \frac{1}{5} \varphi_5 \right] \\ \varphi_1 &= f(x_n, y_n), & \varphi_2 &= f \left(x_n + \frac{h}{4}, y_n + \frac{h}{4} \varphi_1 \right) \\ \varphi_3 &= f \left(x_n + \frac{3h}{8}, y_n + \frac{3h}{32} \varphi_1 + \frac{9h}{32} \varphi_2 \right) \\ \varphi_4 &= f \left(x_n + \frac{12h}{13}, y_n + \frac{1932}{2197} h\varphi_1 - \frac{7200}{2197} h\varphi_2 + \frac{7296}{2197} h\varphi_3 \right) \\ \varphi_5 &= f \left(x_n + h, y_n + \frac{439}{216} h\varphi_1 - 8h\varphi_2 + \frac{3680}{513} h\varphi_3 - \frac{845}{4104} h\varphi_4 \right) \end{aligned}$$

Métodos multipasso lineares com $p + 1$ passos, $p > 0$:

$$y_{n+1} = \sum_{k=0}^p a_k y_{n-k} + h \sum_{k=-1}^p b_k f(x_{n-k}, y_{n-k}), \quad n \geq p$$

$$|a_p| + |b_p| \neq 0$$

$$x_n = x_0 + nh, \quad n = 0, 1, \dots, N, \quad N \in \mathbb{Z}^+$$

- Erro de discretização local:

$$\begin{aligned} \tau(x, y; h) &= \frac{1}{h} \left[Y(x+h) - \sum_{k=0}^p a_k Y(x-kh) \right] \\ &\quad - \sum_{k=-1}^p b_k f(x-kh, Y(x-kh)), \quad Y(x) = y \end{aligned}$$

- Condições de consistência ($q \geq 1$: ordem de consistência, $f \in C^{q+1}(D)$):

$$\begin{cases} q = 1 : & C_0 = 0, \quad C_1 = 0, \quad C_2 \neq 0 \\ q \geq 2 : & C_0 = 0, \quad C_1 = C_2 = \dots = C_q = 0, \quad C_{q+1} \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} C_0 &= 1 - \sum_{k=0}^p a_k, \quad C_1 = 1 + \sum_{k=0}^p k a_k - \sum_{k=-1}^p b_k, \\ C_j &= 1 - \sum_{k=0}^p (-k)^j a_k - j \sum_{k=-1}^p (-k)^{j-1} b_k, \quad j = 2, 3, \dots \end{aligned}$$

$$\tau(x, y; h) = \frac{h^q}{(q+1)!} C_{q+1}(D^q f)(x, y) + \mathcal{O}(h^{q+1})$$

- Condição da raiz:

$$\rho(r) = r^{p+1} - \sum_{k=0}^p a_k r^{p-k} = \prod_{j=0}^p (r - r_j)$$

$$(i) \quad |r_j| \leq 1, \quad j = 0, 1, \dots, p; \quad (ii) \quad |r_j| = 1 \Rightarrow \rho'(r_j) \neq 0$$

- Métodos de Adams-Bashforth ($f_m := f(x_m, y_m)$):

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{k=0}^p b_k f_{n-k}, \quad n \geq p$$

$$\circ \bullet \quad p = 1, \quad q = 2: \quad \begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [3f_n - f_{n-1}] \\ \tau(x, y; h) = \frac{5h^2}{12} (D^2 f)(x, y) + \mathcal{O}(h^3) \end{cases}$$

- • $p = 2, q = 3$:
$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{12} [23f_n - 16f_{n-1} + 5f_{n-2}] \\ \tau(x, y; h) = \frac{3h^3}{8} (D^3 f)(x, y) + \mathcal{O}(h^4) \end{cases}$$
- • $p = 3, q = 4$:
$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24} [55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3}], \\ \tau(x, y; h) = \frac{251h^4}{720} (D^4 f)(x, y) + \mathcal{O}(h^5) \end{cases}$$
- • $p = 4, q = 5$:
$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{720} [1901f_n - 2774f_{n-1} + 2616f_{n-2} \\ \quad - 1274f_{n-3} + 251f_{n-4}], \\ \tau(x, y; h) = \frac{95h^5}{288} (D^5 f)(x, y) + \mathcal{O}(h^6) \end{cases}$$

- Métodos de Adams-Moulton ($f_m := f(x_m, y_m)$):

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{k=-1}^p b_k f_{n-k}, \quad n \geq p$$

$$\circ \bullet \quad p = 0, \quad q = 2: \quad \left\{ \begin{array}{l} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f_{n+1} + f_n] \\ \tau(x, y; h) = -\frac{h^2}{12} (D^2 f)(x, y) + \mathcal{O}(h^3) \end{array} \right.$$

$$\circ \bullet \quad p = 1, \quad q = 3: \quad \left\{ \begin{array}{l} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{12} [5f_{n+1} + 8f_n - f_{n-1}] \\ \tau(x, y; h) = -\frac{h^3}{24} (D^3 f)(x, y) + \mathcal{O}(h^4) \end{array} \right.$$

$$\circ \bullet \quad p = 2, \quad q = 4: \quad \left\{ \begin{array}{l} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24} [9f_{n+1} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2}] \\ \tau(x, y; h) = -\frac{19h^4}{720} (D^4 f)(x, y) + \mathcal{O}(h^5) \end{array} \right.$$