

## ANÁLISE MATEMÁTICA IV – LEEC

RECUPERAÇÃO DO TESTE 3 – 12/JUNHO/2003 – 18H10-19H

### Instruções

- **Não abra este caderno** de teste antes de ser anunciado o início da prova.
- Preencha os seus dados na parte de baixo desta folha.
- Cada uma das cinco alíneas vale 4 pontos.
- Apresente e justifique todos os cálculos.
- Não é permitida a utilização de quaisquer elementos de consulta nem de máquinas calculadoras.
- **A revisão de provas** é na 6<sup>a</sup> feira, 20 de Junho, 11h-12h, na sala de dúvidas.
- Boa sorte!

### Fórmulas para Transformadas de Laplace

$$\text{Sendo } F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}, \quad \mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a), \quad \mathcal{L}\{-tf(t)\} = \frac{d}{ds}F(s),$$

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0), \quad \mathcal{L}\{H_c(t)f(t-c)\} = e^{-cs}F(s).$$

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}, \quad \mathcal{L}\{\cos bt\} = \frac{s}{s^2+b^2}, \quad \mathcal{L}\{\sin bt\} = \frac{b}{s^2+b^2}, \quad \mathcal{L}\{\delta_c(t)\} = e^{-cs}.$$

### Fórmulas para Séries de Fourier

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx.$$

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right), \quad a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx, \quad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.$$

### Para a correção

pergunta	classificação
1(a)	
1(b)	
2(a)	
2(b)	
3	
total	

Nº: \_\_\_\_\_

Sala: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

(1) (a) Calcule a transformada de Laplace de

$$f(t) = \begin{cases} e^{-t}, & \text{se } 0 \leq t \leq 1, \\ e^{-t} + 3, & \text{se } t > 1. \end{cases}$$

(b) Resolva o seguinte problema de valor inicial:

$$\begin{cases} \dot{y} + y = f(t) + \delta_2(t) \\ y(0) = 1 , \end{cases}$$

onde  $f(t)$  é a função da alínea anterior.

- (2) (a) Ache o desenvolvimento em série co-senos da função  $g(x) = \cos^2 \frac{x}{2}$ ,  $x \in [0, \pi]$ .  
Sugestão:  $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$  e  $\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$ .

- (b) Determine a solução (satisfazendo a equação diferencial para  $t > 0$  e  $0 < x < \pi$ ) do seguinte problema para a equação do calor:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{4} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \\ \frac{\partial u}{\partial x}(t, 0) = \frac{\partial u}{\partial x}(t, \pi) = 0, \\ u(0, x) = \cos^2 \frac{x}{2}. \end{cases}$$

(3) Seja  $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$  uma função contínua tal que

$$\int_0^\pi f(x) \sin(nx) dx = 0$$

para todos os inteiros  $n \geq 1$ . Será que  $f$  tem que ser a função identicamente nula?