

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
Licenciatura em Engenharia Química
Licenciatura em Engenharia Biológica
Ano Lectivo: 2003/2004

ANÁLISE E SIMULAÇÃO NUMÉRICA

Exercícios

4.1. Considere o sistema de equações não lineares

$$\begin{cases} x_1 = \frac{0.5}{1 + (x_1 + x_2)^2} \\ x_2 = \frac{0.5}{1 + (x_1 - x_2)^2} \end{cases}$$

Mostre que o sistema tem uma única solução e aproxime-a pelo método do ponto fixo. Obtenha uma estimativa do erro para a solução aproximada na norma do máximo.

4.2. Considere o sistema de equações não-lineares

$$\begin{cases} x_1 - \frac{x_2}{4} \cos(x_1) = 0 \\ 1 - x_2 + |x_1 - 1| = 0 \end{cases}$$

a) Mostre que existe uma e uma só solução $x \in [0, 1] \times [1, 2]$.

b) Determine uma aproximação da solução por forma a que o erro absoluto verifique $\|e\|_\infty < 0.05$.

4.3. Considere o sistema de equações não lineares

$$\begin{cases} x_1 = f(x_1 + x_2) \\ x_2 = g(x_1 + x_2) \end{cases}$$

em que as funções f e g verificam $|f'(t)| < \alpha$, $|g'(t)| < \beta$, para qualquer $t \in \mathbb{R}$ e em que $f(\mathbb{R}) \subseteq [a, b]$, $g(\mathbb{R}) \subseteq [a, b]$.

a) Mostre que existe uma única solução do sistema em \mathbb{R}^2 se $\alpha + \beta < 1$, que essa solução se encontra em $[a, b] \times [a, b]$, e que o método do ponto fixo converge, quaisquer que sejam os valores iniciais em \mathbb{R} .

b) Reduza o sistema anterior à resolução de duas equações em \mathbb{R} , e mostre o mesmo resultado que em a).

c) Concretize os resultados anteriores para o sistema

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2} \cos(x_1 + x_2) - \cos^2\left(\frac{1}{5}(x_1 + x_2)\right) \\ x_2 = \sin\left(\frac{1}{3}(x_1 + x_2)\right) + \frac{1}{4} \sin^2(x_1 + x_2) \end{cases}$$

d) Começando com $(0,0)$, determine uma iterada pelo método de Newton em \mathbb{R}^2 para a aproximação da solução do sistema anterior.

4.4. Considere o sistema de equações

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + \varepsilon \cos(x_3) = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 3\varepsilon x_1 x_3 = 0 \\ \varepsilon x_1^2 + x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

a) Mostre que para $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$ o sistema tem solução única no conjunto

$$S = \left\{ x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : |x_1|, |x_2|, |x_3| \leq \frac{1}{2} \right\}.$$

b) Usando a função iteradora

$$G(x) = \left(-\frac{1}{2}(x_2 + \varepsilon \cos(x_3)), -\frac{x_1}{3} + \varepsilon x_1 x_3, \frac{1}{3}(x_2 - \varepsilon x_1^2) \right),$$

mostre que, aplicando o método do ponto fixo, se tem

$$\left| x_3 - x_3^{(m)} \right| \leq \frac{5^m}{6^{m-1}} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_\infty$$

qualquer que seja o vector inicial $x^{(0)} \in S$.

c) No caso $\varepsilon = 0$, mostre que o método de Jacobi converge e que temos

$$\|x^{(m)}\|_\infty \leq \left(\frac{1}{2}\right)^m \|x^{(0)}\|_\infty$$

para qualquer $x^{(0)} \in \mathbb{R}^3$.

4.5. Considere o sistema não-linear

$$\begin{cases} 2x_1 - \cos(x_1 + x_2) = 2 \\ 3x_2 - \sin(x_1 + x_2) = 6 \end{cases}$$

a) Verifique que existe uma e uma só solução em \mathbb{R}^2 e que ela está em $X = \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right] \times \left[\frac{5}{3}, \frac{7}{3}\right]$.

b) Inicializando com $x^{(0)} = [1 \ 1]^T$ calcule duas iterações pelo método do ponto fixo.

c) Efectue o mesmo que em b) usando o método de Newton.

4.6. Considere um sistema de equações escrito na forma $F(x) = 0$, e seja $J_F(x)$ a matriz jacobiana de F calculada em x .

a) Mostre que se existir um $\omega \in \mathbb{R}$ tal que $\|I + \omega J_F(x)\| \leq L < 1$, $\forall x \in \mathbb{R}^n$, então o sistema possui uma única solução em \mathbb{R}^n .

b) Conclua que o sistema

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 + \sin(x_3) = 1 \\ x_1 + 4x_2 + \cos(x_3) = 1 \\ \sin(x_1) + \cos(x_2) + 4x_3 = 1 \end{cases}$$

tem uma única solução em \mathbb{R}^3 , que está no conjunto $[-\frac{1}{4}, \frac{1}{2}] \times [-\frac{3}{8}, \frac{3}{8}] \times [-\frac{3}{8}, \frac{3}{8}]$.

c) Determine uma aproximação dessa solução calculando duas iterações pelo método de Newton, começando com a iterada inicial $x^{(0)} = 0$.

4.7. Pretende-se resolver pelo método de Newton o seguinte sistema de equações não-lineares

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2(x_3 + 1) = 10 \\ 3(x_2 + 1) + x_3^2 = 11 \\ 3x_1 + x_3^2 = 9 \end{cases}$$

tomando como aproximação inicial $x^{(0)} = [3 \ 2 \ 1]^T$.

a) Mostre que o sistema linear $Ax = b$ a ser resolvido para se obter $x^{(1)}$ é tal que

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Obtenha ainda o vector b .

b) Resolva o sistema linear obtido em a), pelo método de eliminação de Gauss com pesquisa parcial de pivot, e obtenha $x^{(1)}$.

4.8. Pretende-se resolver pelo método de Newton o sistema de equações não lineares

$$\begin{cases} e^{x_1} - 3 = 0 \\ 3x_2 + 4x_3 = 3 \\ 2x_1^2 + 2x_1 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

a) Tomando como aproximação inicial $x^{(0)} = [0 \ 1 \ 2]^T$, ao efectuar uma iteração pelo método de Newton, somos conduzidos a resolver um certo sistema de equações lineares. Qual?

b) Resolva o sistema de equações lineares obtido na alínea anterior, utilizando o método de Gauss-Seidel, considerando como aproximação inicial o vector nulo e efectuando duas iterações.

4.9. Considere o seguinte sistema de equações não lineares:

$$\begin{cases} x_1^3 + 5x_2 - 2x_3 = 0 \\ e^{x_2} - x_3^2 = 1 \\ -x_1^2 + x_2 + x_3 = \mu \end{cases}$$

onde μ é um número real conhecido, próximo de 0. Para aproximar uma solução deste sistema pretende-se utilizar o método de Newton. Tomando como aproximação inicial o vector $x^{(0)} = [c \ 0 \ 0]^T$, onde c é um certo número real, para obter a aproximação $x^{(1)}$ somos levados a resolver um sistema linear com a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 3c^2 & 5 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2c & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

- a) Mostre como se obteve esta matriz e calcule o segundo membro do sistema.
- b) Factorize a matriz pelo método de Doolittle e diga para que valores de c o sistema linear considerado tem solução única.
- c) No caso de $c = 1$, resolva o sistema pelo método de Doolittle e calcule $x^{(1)}$ (primeira iterada do método de Newton).
- d) No caso de se aplicar o método de Jacobi para resolver o sistema linear, diga para que valores de c está garantida a condição necessária e suficiente de convergência do método.

4.10. Resolva o sistema não linear

$$\begin{cases} x_1^2 + x_1 x_2^3 = 9 \\ 3x_1^2 x_2 - x_2^3 = 4 \end{cases}$$

utilizando o método de Newton e partindo de aproximações iniciais $x^{(0)} = [1.2 \ 2.5]^T$, $[-2.0 \ 2.5]^T$ e $[2.0 \ -2.5]^T$. Investigue a existência de outras soluções para o sistema.