

# Cálculo Diferencial e Integral I

MEEC

1º Semestre de 2019/2020

## Exemplos de primitivação de funções racionais<sup>1</sup>

**Exemplo 1 (raízes reais simples)** *Considere-se a função racional*

$$f(x) = \frac{4x^2 + x + 1}{x^3 - x} = \frac{4x^2 + x + 1}{x(x-1)(x+1)}$$

*A decomposição em fracções simples, neste caso, é da forma ( $a, b, c \in \mathbb{R}$ )*

$$f(x) = \frac{4x^2 + x + 1}{x(x-1)(x+1)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{x+1}$$

*pelo que*

$$4x^2 + x + 1 = a(x-1)(x+1) + bx(x+1) + cx(x-1)$$

*ou ainda*

$$4x^2 + x + 1 = (a+b+c)x^2 + (b-c)x - a$$

*Usando o princípio da identidade de polinómios, obtém-se o sistema*

$$\begin{cases} a + b + c = 4 \\ b - c = 1 \\ -a = 1 \end{cases}$$

*cuja solução é  $a = -1$ ,  $b = 3$  e  $c = 2$ . Logo*

$$f(x) = -\frac{1}{x} + \frac{3}{x-1} + \frac{2}{x+1},$$

*em cada intervalo contido no domínio da função. Em cada um desses intervalos, tem-se*

$$P f(x) = -\log|x| + 3\log|x-1| + 2\log|x+1| + k$$

*com  $k \in \mathbb{R}$ .*

---

<sup>1</sup>Ver [1].

**Exemplo 2 (raízes reais simples e múltiplas)** Considere-se a função racional

$$g(x) = \frac{4x + 1}{x(x + 1)^3}$$

Neste caso, a decomposição em frações simples é da forma (com  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ )

$$\frac{4x + 1}{x(x + 1)^3} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x + 1} + \frac{c}{(x + 1)^2} + \frac{d}{(x + 1)^3}$$

pelo que

$$4x + 1 = (a + b)x^3 + (3a + 2b + c)x^2 + (3a + b + c + d)x + a \quad (1)$$

Obtém-se assim o sistema<sup>2</sup>

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ 3a + 2b + c = 0 \\ 3a + b + c + d = 4 \\ a = 1 \end{cases}$$

cuja solução é  $a = 1$ ,  $b = c = -1$  e  $d = 3$ . Logo, em cada um dos intervalos contidos no domínio de  $g$ , tem-se

$$g(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x + 1} - \frac{1}{(x + 1)^2} + \frac{3}{(x + 1)^3}.$$

Assim, em qualquer daqueles intervalos

$$P g(x) = \log |x| - \log |x + 1| + \frac{1}{x + 1} - \frac{3}{2} \frac{1}{(x + 1)^2} + k$$

com  $k \in \mathbb{R}$ .

---

<sup>2</sup>Alternativamente, a partir da equação (??), obtém-se

- (i) Fazendo  $x = 0$  vem  $1 = a$ , i.e.,  $a = 1$ .
- (ii) Fazendo  $x = -1$  vem  $-3 = -d$ , i.e.,  $d = 3$ .
- (iii) Igualando os coeficientes de  $x^3$  e de  $x^2$ , respectivamente, em ambos os membros da igualdade, vem

$$\begin{aligned} 0 = a + b &\Rightarrow b = -1 \\ 3a + 2b + c = 0 &\Rightarrow c = -1 \end{aligned}$$

**Exemplo 3 (com um polinómio irreduzível do 2º grau, simples)** *Considere-se a função racional*

$$h(x) = \frac{x+2}{x^3-1} = \frac{x+2}{(x-1)(x^2+x+1)}$$

*Como o segundo factor no denominador não tem raízes reais, não é possível, trabalhando com funções reais, decompôr a fracção numa soma de fracções simples dos tipos considerados nos dois Exemplos anteriores. No caso presente, tem-se (para qualquer  $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ ,  $a, b, c \in \mathbb{R}$ )*

$$\frac{x+2}{x^3-1} = \frac{a}{x-1} + \frac{bx+c}{x^2+x+1}$$

*pelo que*

$$x+2 = a(x^2+x+1) + (bx+c)(x-1)$$

*ou, de forma equivalente*

$$x+2 = (a+b)x^2 + (a-b+c)x + a-c$$

*O princípio da identidade de polinómios conduz assim ao sistema*

$$\begin{cases} a+b=0 \\ a-b+c=1 \\ a-c=2 \end{cases}$$

*cuja solução é  $a=1$ ,  $b=c=-1$ . Logo*

$$h(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{x+1}{x^2+x+1},$$

*em cada intervalo contido no domínio de  $g$ . A primeira parcela é de primitivação imediata, obtendo-se*

$$P h(x) = \log|x-1| - P \frac{x+1}{x^2+x+1}.$$

*Para primitivar a segunda parcela pode fazer-se*

$$\frac{x+1}{x^2+x+1} = \frac{x+1}{(x+1/2)^2+3/4} = \frac{x+1}{(x-p)^2+q^2}$$

*com  $p=-1/2$ ,  $q=\sqrt{3}/2$ . Usa-se então a mudança de variável*

$$x = \varphi(t) = p + qt = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}t, \quad \varphi'(t) = \frac{\sqrt{3}}{2}t$$

que conduz, por substituição, à primitivação de

$$\phi'(t) = h(\varphi(t))\varphi'(t) = \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{1}{1+t^2} + \frac{1}{2} \frac{2t}{1+t^2},$$

cuja primitiva é (a menos de uma constante)

$$\phi(t) = \frac{\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg} t + \frac{1}{2} \log(1+t^2).$$

Finalmente, sendo  $t = \frac{2}{\sqrt{3}}(x + \frac{1}{2})$ , obtém-se

$$P h(x) = \log|x-1| - \frac{\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg} \left( \frac{2\sqrt{3}}{3}x + \frac{\sqrt{3}}{3} \right) - \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{4}{3} \left( x + \frac{1}{2} \right)^2 \right) + k,$$

com  $k \in \mathbb{R}$ .

**Exemplo 4 (com um polinómio irreduzível do 2º grau, duplo)** *Considere-se a função racional*

$$r(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 5}{(x-1)(x^2+2)^2}.$$

A decomposição em soma de fracções simples é agora da forma

$$r(x) = \frac{a}{x-1} + \frac{bx+c}{x^2+2} + \frac{dx+e}{(x^2+2)^2}.$$

Por processo idêntico ao considerado anteriormente, obtêm-se as constantes

$$a = 1, \quad b = -1, \quad c = 0, \quad d = 1, \quad e = -1.$$

Logo,

$$r(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{x}{x^2+2} + \frac{x-1}{(x^2+2)^2}.$$

As duas primeiras parcelas são de primitivação imediata. Quanto à terceira, pode ser escrita como

$$\frac{x}{(x^2+2)^2} - \frac{1}{(x^2+2)^2},$$

sendo a primeira destas duas de primitivação imediata. A segunda pode obter-se da seguinte forma<sup>3</sup>:

$$\begin{aligned} \text{P} \frac{1}{(x^2 + 2)^2} &= \frac{1}{2} \text{P} \frac{2}{(x^2 + 2)^2} \\ &= \frac{1}{2} \text{P} \frac{x^2 + 2 - x^2}{(x^2 + 2)^2} \\ &= \frac{1}{2} \text{P} \frac{x^2 + 2}{(x^2 + 2)^2} - \frac{1}{2} \text{P} \frac{x^2}{(x^2 + 2)^2} \\ &= \frac{1}{2} \text{P} \frac{1}{x^2 + 2} - \frac{1}{2} \text{P} \frac{x^2}{(x^2 + 2)^2} = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \left( \frac{x}{\sqrt{2}} \right) - \frac{1}{2} \text{P} \frac{x^2}{(x^2 + 2)^2}. \end{aligned}$$

Finalmente, para lidar com a última parcela usamos primitivação por partes,

$$\text{P} \frac{x^2}{(x^2 + 2)^2} = \text{P} x \frac{x}{(x^2 + 2)^2} = -\frac{x}{2} \frac{1}{x^2 + 2} + \frac{1}{2} \text{P} \frac{1}{x^2 + 2}.$$

A última primitiva já é imediata (e de facto já a calculámos atrás). Deixa-se como exercício coligir todos os cálculos parciais e verificar que

$$\text{P} r(x) = \log |x - 1| - \frac{1}{2} \log(x^2 + 2) - \frac{1}{4\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{1}{4} \frac{x + 2}{x^2 + 2} + k$$

com  $k \in \mathbb{R}$ , em cada um dos intervalos contidos no domínio de  $r$ .

## Referências

[1] J. Campos Ferreira. Introdução à Análise Matemática, Fundação Calouste Gulbenkian, 8ª ed., 2005.

---

<sup>3</sup>A ideia base é a que permite obter a fórmula de recorrência da página 478 de *Introdução à Análise Matemática* que, conjuntamente com uma mudança de variável  $t = \frac{x+a}{b}$ , permite lidar com primitivas da forma  $\text{P} \frac{1}{((x+a)^2 + b^2)^n}$  com  $b > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ .