

ANÁLISE MATEMÁTICA III
TESTE DE RECUPERAÇÃO 1
18 DE JUNHO DE 2005

apresente e justifique todos os cálculos

duração: hora e meia (9:00 - 10:30)

(1) Considere a região

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z > 1; x + y < 1; x > 0; y > 0; 0 < z < 2\}.$$

(2 val)

(a) Exprima o volume de V em termos de integrais iterados da forma

$$\int (\int (\int dz) dy) dx.$$

Resolução: $\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_{1-x-y}^2 dz dy dx$

(2 val)

(b) Exprima o volume de V em termos de integrais iterados da forma

$$\int (\int (\int dx) dy) dz.$$

Resolução:

$$\int_0^1 \left[\int_0^{1-z} \int_{1-z-y}^{1-y} dx dy + \int_{1-z}^1 \int_0^{1-y} dx dy \right] dz + \int_1^2 \int_0^1 \int_0^{1-y} dx dy dz$$

(2 val)

(c) Calcule o integral $\int_V \frac{1}{1+x+y}$.

Resolução:

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_{1-x-y}^2 \frac{1}{1+x+y} dz dy dx = \frac{1}{2}$$

(4 val)

(2) Considere o sólido $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 < 2; 0 < z < x^2 + y^2\}$ com densidade de massa $\sigma = 1$. Calcule o momento de inércia de S relativo ao eixo Oz .

Resolução:

$$\int_S \sigma \cdot (x^2 + y^2) = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{\sqrt{z}}^{\sqrt{2-z^2}} r^2 \cdot r dr dz d\theta = \frac{19}{15}\pi$$

(3) Considere os campos vectoriais

$$F(x, y) = \left(\frac{xy}{1+x}, -\log(1+x) \right) \quad \text{e} \quad G(x, y) = (0, x)$$

definidos na região

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + 1 > 0\}.$$

(2 val)

(a) Calcule o trabalho realizado pelo campo $F + G$ ao longo do triângulo com vértices nos pontos $(0, 0)$, $(1, 1)$ e $(2, 0)$ percorrido no sentido anti-horário.

Resolução: $F + G$ é fechado, e Ω é simplesmente conexo e, portanto, o trabalho é nulo.

(2 val)

(b) Calcule o trabalho realizado pelo campo F ao longo do triângulo com vértices nos pontos $(0, 0)$, $(1, 1)$ e $(2, 0)$ percorrido no sentido anti-horário.

Resolução: Seja C o triângulo com vértices nos pontos $(0, 0)$, $(1, 1)$ e $(2, 0)$ percorrido no sentido anti-horário. Sendo $\int_C (F + G) = 0$, então $\int_C F = -\int_C G$. Aplicando o teorema de Green ao campo G , obtém-se $\int_C F = -\int_C G = -\int_{\Delta} 1 = -1$, em que Δ é o interior do triângulo C .

(3 val)

(c) Determine uma função real $\varphi(x, y)$ tal que $\varphi(0, 0) = 0$ e $\nabla\varphi = F + G$. Determine, justificando, se esta função é única.

Resolução: É fácil ver que $\varphi(x, y) = xy - y \log(1+x)$. Seja $\psi(x, y)$ uma função de classe C^1 em Ω . Tem-se $\psi(x, y) - \psi(0, 0) = \int_0^1 \nabla\psi \cdot (x, y) dt$ para qualquer $(x, y) \in \Omega$. Portanto, dado que $\nabla\psi = \nabla\varphi$ e $\psi(0, 0) = \varphi(0, 0)$, obtemos $\varphi(x, y) = \psi(x, y)$, ou seja, o potencial escalar é único.

(4) Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua e positiva. Considere a região

$$V(f) = \{(r \cos \theta, r \sin \theta, t) \in \mathbb{R}^3 : a < t < b; -\pi < \theta < \pi; 0 \leq r < f(t)\}.$$

(2 val)

(a) Calcule o volume de $V(f)$ em termos de f .

Resolução:

$$\text{vol}(V(f)) = \int_{-\pi}^{\pi} \int_a^b \int_0^{f(t)} r dr dt d\theta = \pi \int_a^b [f(t)]^2 dt$$

(1 val)

(b) Usando a alínea anterior, determine o volume do cone de altura 1 e raio 1.

Resolução: O cone é descrito por $f(t) = t$, $a = 0$ e $b = 1$ e, portanto,

$$\text{vol}(V(f)) = \pi \int_0^1 t^2 dt = \frac{\pi}{3}$$