

Análise Matemática III

1º semestre de 1999/2000

Exercício teste 3

Mostre que a função $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = e^{-x}$$

é uma função limite superior no intervalo $[1, +\infty[$.

Solução: Considere-se a sucessão de funções em escada $s_k(x) : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ definidas por:

$$s_k(x) = \begin{cases} e^{-\frac{n+1}{2^k}} & \text{se } \frac{n}{2^k} \leq x < \frac{n+1}{2^k} \text{ e } 2^k \leq n < k2^k \\ 0 & \text{se } x \geq k \end{cases}$$

Por palavras, s_k obtém-se subdividindo o intervalo $[1, k]$ em subintervalos de comprimento 2^{-k} e definindo s_k como sendo constante igual ao ínfimo de f no interior de cada um destes subintervalos e 0 para $x \geq k$ (recorde-se que uma função em escada tem de ser 0 fora de algum intervalo limitado).

Então

- (i) $s_k(x) \leq s_{k+1}(x)$ porque os subintervalos onde a função $s_{k+1}(x)$ é constante estão contidos naqueles onde $s_k(x)$ é constante e ambas as funções são definidas como sendo o ínfimo de f nestes intervalos.
- (ii) $s_k(x) \rightarrow f(x)$ para todo o x porque a função f é contínua, o comprimento dos intervalos onde s_k é constante e positiva está a tender para 0 com k e qualquer x pertence a estes intervalos para k suficientemente grande.
- (iii) Como $s_k(x) \leq f(x)$ no intervalo $[1, k]$ temos

$$\int_{[1, +\infty[} s_k = \int_1^k s_k(x) dx \leq \int_1^k f(x) dx$$

onde o último integral existe e pode ser calculado da maneira usual uma vez que f é contínua no intervalo compacto $[1, k]$. Assim

$$\int_{[1, +\infty[} s_k = -e^{-x} \Big|_1^k = \frac{1}{e} - e^{-k} \leq \frac{1}{e}$$

e portanto a sucessão dos integrais das funções s_k é limitada.

Concluimos que f é uma função limite superior.