

## Análise Matemática III

### 2º semestre de 1999/2000

**Exercício teste 8** (entregar na aula prática da semana de 22/5/00)

Seja  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  a função definida por

$$F(x, y, z) = (F_1(x, y, z), F_2(x, y, z)) = (x + y + z, x \cos(y^2 + z^2) + z).$$

a) Suponha que queremos resolver as equações  $F(x, y, z) = 0$ , na vizinhança da solução dada por  $(0, 0, 0)$ , em ordem a um par de variáveis. Quais são as escolhas aconselháveis para esse par de variáveis ?

b) Para uma das possibilidades encontradas na alínea a), calcule as derivadas da solução implícita em ordem à variável livre, no ponto correspondente à solução  $(0, 0, 0)$ .

**Solução:** A função  $F$  é de classe  $C^1$ . Calculemos a sua matriz Jacobiana:

$$DF = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x} & \frac{\partial F_1}{\partial y} & \frac{\partial F_1}{\partial z} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x} & \frac{\partial F_2}{\partial y} & \frac{\partial F_2}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \cos(y^2 + z^2) & -2xy \sin(y^2 + z^2) & -2xz \sin(y^2 + z^2) + 1 \end{bmatrix}$$

No ponto  $(0, 0, 0)$  temos

$$DF(0, 0, 0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

O sistema  $F = 0$  é de duas equações a três incógnitas. Vamos tentar resolvê-lo, na vizinhança da solução  $(0, 0, 0)$ , escrevendo duas das variáveis em função da terceira. As colunas de  $DF(0, 0, 0)$  correspondentes a  $(x, y)$  são independentes. Logo pelo TFI podemos localmente, pelo menos implicitamente, escrever  $x$  e  $y$  em função de  $z$ , *i.e.* obtemos funções de classe  $C^1$ ,  $x(z)$  e  $y(z)$  definidas numa vizinhança de  $z = 0$ , que satisfazem o sistema de equações:  $F(x(z), y(z), z) = 0$ .

O mesmo se aplica para  $(y, z)$  que podemos escrever localmente em função de  $x$ . No entanto, as colunas de  $DF(0, 0, 0)$  correspondentes a  $x$  e  $z$  não são independentes: seria uma má escolha tentar resolver o sistema na vizinhança de  $(0, 0, 0)$  escrevendo  $x$  e  $z$  em função de  $y$ .

b) Vamos calcular as derivadas das funções implícitas  $x(z)$  e  $y(z)$ . Para isso consideramos a função  $g$  definida, numa vizinhança de  $z = 0$ , por  $g(z) = (x(z), y(z), z)$ . Temos que nessa vizinhança  $F \circ g(z) = 0$ . Usando a derivada da função composta obtemos:

$$\begin{aligned} D(F \circ g)(z) &= DF(g(z)) \cdot Dg(z) = \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \cos(y^2 + z^2) & -2xy \sin(y^2 + z^2) & -2xz \sin(y^2 + z^2) + 1 \end{bmatrix} (z) \cdot \begin{bmatrix} x'(z) \\ y'(z) \\ 1 \end{bmatrix} = 0. \end{aligned}$$

No ponto  $(0, 0, 0)$ , temos então

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} (z) \cdot \begin{bmatrix} x'(0) \\ y'(0) \\ 1 \end{bmatrix} = 0.$$

Resolvendo este sistema obtemos finalmente,  $x'(0) = -1$  e  $y'(0) = 0$ .