

Cálculo Diferencial e Integral II

Ficha de trabalho 3

(Derivada da Função Composta)

1. Calcule a derivada $D(f \circ g)(1, 1)$ em que

$$g(x, y) = (e^{x-y}, x - y); \quad f(u, v) = (u + \arctan v, 2e^v + u, \ln(u + 2v)).$$

2. Considere as funções $\gamma(t) = (\sin t, t^2, \cos t)$, $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 1$ e $\sigma(t) = F(\gamma(t))$. Calcule a derivada $\sigma'(t)$.

3. Considere a função $f(x, y, z) = ye^x + xz^2$ e seja $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ uma função de classe C^1 tal que $g(0, 0) = (0, 1, 2)$ e

$$Dg(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}.$$

Calcule a derivada $D_v(f \circ g)(0, 0)$ em que $\vec{v} = (1, 2)$.

4. Considere a função $\sigma(x) = f(\sin x, x + e^x)$ em que $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ é de classe C^1 e tal que

$$Df(0, 1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Calcule a derivada $\sigma'(0)$.

5. Seja $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2, x + y - z, xye^z)$$

e $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável.

- a) Calcule $\frac{\partial}{\partial y}(g \circ f)(1, 1, 0)$, sabendo que $\nabla g(2, 2, 1) = (-1, 0, 3)$.

- b) Para $g(u, v, w) = u^2 - v^2 + e^w$, calcule $\frac{\partial}{\partial z}(g \circ f)(0, 1, 0)$.

6. Determine a reta tangente e a reta normal à curva definida por

$$\left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \right\}$$

no ponto $(1, \frac{3\sqrt{3}}{2})$.

7. Determine a reta tangente e o plano normal à linha definida por

$$\{(e^t, \cos t, \sin t); -\pi < t < \pi\}$$

no ponto $(1, 1, 0)$.

8. Determine a reta normal e o plano tangente ao parabolóide

$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 1 - x^2 - y^2\}$$

no ponto $(0, 1, 0)$.

9. Seja $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável. Determine

$$\frac{\partial}{\partial x}(g(g(x^2, xy, x+y) + e^x, xy, g(x, x, x)))$$

em função das derivadas parciais de g .

10. Sejam $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ funções de classe C^1 e tais que se verifica a equação $F(x, y, g(x, y)) = 0$. Supondo que $\frac{\partial F}{\partial z}(x, y, z) \neq 0$ calcule a derivada $Dg(x, y)$.

11. Determine os pontos da superfície $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 - z^2 + 1 = x\}$ tais que a recta normal à superfície em cada um desses pontos passa pela origem.

12. Considere a superfície

$$S = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x^2}{3} + \frac{(y-z)^2}{2} + (y+z)^2 = 12 \right\}.$$

Determine os pontos de S onde o plano tangente é horizontal.