

Análise Matemática III

1º semestre de 2002/2003

Exercício teste 2 (a entregar na aula prática da semana de 30/9/2002)

1) Mostre que o seguinte conjunto

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = \frac{z^2}{n}, |z| < 1, n \in \mathbb{N}\}$$

tem medida nula em \mathbb{R}^3 .

2) Seja $I \subset \mathbb{R}^3$ o intervalo $I =]0, 1[\times]0, 2[\times]0, 2[$ e seja $s : I \rightarrow \mathbb{R}$ a função em escada definida por

$$s(x, y, z) = \begin{cases} 2 & 0 < x < 1/2, 0 < y < 1, 0 < z < 1 \\ 3 & 0 < x < 1/2, 0 < y < 1, 1 < z < 2 \\ 5 & 0 < x < 1/2, 1 < y < 2, 0 < z < 2 \\ 1/2 & 1/2 < x < 1, 0 < y < 2, 0 < z < 1 \\ \pi & 1/2 < x < 1, 0 < y < 2, 1 < z < 2 \end{cases}$$

a) Calcule $\int_I s$.

b) Se s tiver unidades de densidade de massa, por exemplo Kg/m^3 , e se os comprimentos, i.e. x, y, z , estiverem expressos em m , em que unidades vem dado este integral ?

Resolução

1. Observe-se que $S = \cup_{n \in \mathbb{N}} S_n$ onde

$$S_n = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = \frac{z^2}{n}, |z| < 1\}.$$

Como a união numerável de conjuntos de medida nula tem medida nula, para provar que S tem medida nula, basta mostrar que cada S_n tem medida nula. Para isso note-se que cada S_n é uma superfície cônica, que se pode obter como a união dos gráficos em \mathbb{R}^3 de duas funções contínuas definidas em subconjuntos limitados de \mathbb{R}^2 . De facto, para $0 \leq z < 1$ temos

$$z = \sqrt{n(x^2 + y^2)} = f_1(x, y)$$

com $x^2 + y^2 < 1/n$. Para $-1 < z < 0$ temos

$$z = -\sqrt{n(x^2 + y^2)} = f_2(x, y)$$

com $x^2 + y^2 < 1/n$. Assim cada S_n é a união dos gráficos das funções contínuas f_1 e f_2 definidas no conjunto limitado de \mathbb{R}^2 dado por

$$\left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < \frac{1}{n} \right\}.$$

Portanto S tem medida nula em \mathbb{R}^3 .

2.a) Considere-se a partição do intervalo $I =]0, 1[\times]0, 2[\times]0, 2[$ dada por $\{I_j : j = 1, 2, 3, 4, 5\}$ em que

$$\begin{aligned} I_1 &=]0, 1/2[\times]0, 1[\times]0, 1[\\ I_2 &=]0, 1/2[\times]0, 1[\times]1, 2[\\ I_3 &=]0, 1/2[\times]1, 2[\times]0, 2[\\ I_4 &=]1/2, 1[\times]0, 2[\times]0, 1[\\ I_5 &=]1/2, 1[\times]0, 2[\times]1, 2[\end{aligned}$$

Considere-se também o conjunto de valores $\{s_j : j = 1, 2, 3, 4, 5\}$ dados por

$$\begin{aligned} s_1 &= 2 \\ s_2 &= 3 \\ s_3 &= 5 \\ s_4 &= 1/2 \\ s_5 &= \pi \end{aligned}$$

Assim temos $s(x, y, z) = s_j$ para $(x, y, z) \in I_j$ logo o integral é dado por

$$\int_I s = \sum_{j=1}^5 s_j \text{vol}(I_j) = 2 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{2} + 5 \times 1 + \frac{1}{2} \times 1 + \pi \times 1 = 8 + \pi$$

2.b) Se x, y, z estão em m então $\text{vol}(I_j)$ vem em m^3 e se s_j está em Kg/m^3 então o integral $\int_I s$ vem dado em Kg .