

## Análise Matemática III 1º semestre de 2002/2003

**Exercício teste 4** (a entregar na aula prática da semana de 14/10/2002)

1. Esboce a região  $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - z^2 \leq 4, x^2 + y^2 - 4z^2 \geq 1\}$  e calcule o seu volume.

2. Resolva um dos seguintes exercícios:

2a. Determine o volume do elipsóide

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 3x^2 + 2y^2 + z^2 \leq 1\}.$$

2b. Seja  $R \subset \mathbb{R}^2$  uma região plana, situada no semiplano  $x > 0$ , com centróide  $(\bar{x}, \bar{y})$ . Mostre que o volume do sólido de revolução  $S \subset \mathbb{R}^3$  que se obtém quando se roda  $R$  de 360 graus em torno do eixo  $Oy$  é dado por

$$v(S) = 2\pi\bar{x}A(R),$$

onde  $A(R)$  é a área de  $R$ .

### Resolução


1. Para esboçar a região  $S$  observamos que possui simetria axial em relação ao eixo  $Oz$ . Assim, é natural tomar uma mudança de coordenadas  $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  para coordenadas polares  $(\rho, \theta, z)$ :

$$g^{-1}(S) = \{(\rho, \theta, z) \in \mathbb{R}^3 : \rho^2 - z^2 \leq 4, \rho^2 - 4z^2 \geq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}.$$


As curvas  $\rho^2 - z^2 = 4$  e  $\rho^2 - 4z^2 = 1$  são hipérbolas que se intersectam em

$$4 + z^2 = 1 + 4z^2 \iff z = \pm 1.$$

No plano  $(\rho, z)$  temos então:



A região  $S$  é obtida rodando esta região em torno do eixo  $Oz$ :



Assim, podemos calcular o volume da região  $S$  em coordenadas polares da seguinte forma:

$$\begin{aligned} v(S) &= \iiint_S 1 \, dx \, dy \, dz \\ &= \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{1+4z^2}}^{\sqrt{4+z^2}} \rho \, d\rho \, d\theta \, dz \\ &= 3\pi \int_{-1}^1 (1 - z^2) \, dz = 4\pi. \end{aligned}$$

2.a Usamos uma mudança de coordenadas  $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  para coordenadas elipsóidais  $(r, \theta, \varphi)$ . Estas mais não são que uma simples generalização de coordenadas esféricas:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3}r \operatorname{sen}(\varphi) \cos(\theta) \\ y = \frac{1}{2}r \operatorname{sen}(\varphi) \operatorname{sen}(\theta) \\ z = r \cos(\varphi) \end{cases}$$

Calculamos o determinante da matriz Jacobiana desta transformação de forma análoga ao de coordenadas esféricas, obtendo:

$$|\det(g'(r, \theta, \varphi))| = \frac{1}{6}r^2 \operatorname{sen}(\varphi).$$

É claro que nestas coordenadas o elipsóide é descrito por:

$$g^{-1}(E) = \{(r, \theta, \varphi) : r = 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi\}.$$

Assim, o volume do elipsóide é dado por:

$$\begin{aligned} v(E) &= \iiint_E 1 \, dx \, dy \, dz \\ &= \iiint_{g^{-1}(E)} \frac{1}{6}r^2 \operatorname{sen}(\varphi) \, dr \, d\theta \, d\varphi \\ &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{1}{6}r^2 \operatorname{sen}(\varphi) \, d\varphi \, d\theta \, dr = \frac{2\pi}{9}. \end{aligned}$$

2.b) Quando rodamos a figura plana  $R \subset \mathbb{R}^2$ , situada no semiplano  $x > 0$ , de 360 graus em torno do eixo  $Oy$ , obtemos uma região  $S \subset \mathbb{R}^3$  que possui simetria axial em relação ao eixo  $Oy$ . Assim, é natural usarmos uma mudança de coordenadas  $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  para coordenadas cilíndricas  $(\rho, \theta, y)$  a fim de calcular o volume de  $S$ . Note que o eixo de simetria é  $Oy$  e não  $Oz$  (como é habitual em coordenadas cilíndricas):

$$\begin{cases} x = \rho \cos(\theta) \\ y = y \\ z = \rho \sin(\theta) \end{cases}$$

Em coordenadas cilíndricas a região  $S$  é descrita por

$$g^{-1}(S) = \{(\rho, \theta, y) : (\rho, y) \in R, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}.$$

Temos pois que o volume de  $S$  é dado por:

$$\begin{aligned} v(S) &= \iiint_S 1 \, dx \, dy \, dz \\ &= \iiint_{g^{-1}(E)} \rho \, d\rho \, d\theta \, dy \\ &= \int_0^{2\pi} \left( \iint_R \rho \, d\rho \, dy \right) d\theta. \end{aligned}$$

Se identificarmos  $x = \rho$  o integral duplo pode ser expresso na forma:

$$\iint_R \rho \, d\rho \, dy = A(R) \frac{1}{A(R)} \iint_R x \, dx \, dy = A(R) \bar{x}.$$

onde  $A(R)$  é área da região  $R$  e  $\bar{x}$  é a primeira coordenada do centróide de  $R$ . Concluímos então que

$$v(S) = 2\pi \bar{x} A(R),$$

como pretendido.