

# Aula 35

## Teoria Qualitativa de EDOs

### Determinismo e Previsibilidade

- Existência de soluções
- Unicidade de soluções
- Dependência contínuas nas condições iniciais
- Estabilidade

- 2ª Lei de Newton (Mecânica Clássica):

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} \Leftrightarrow \frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2} = \frac{1}{m}\mathbf{F}\left(\mathbf{x}, \frac{d\mathbf{x}}{dt}, t\right),$$

Solução:  $\mathbf{x}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ .

- Equação de Schrödinger (Mecânica Quântica):

$$i\frac{\partial\phi}{\partial t} = -\frac{1}{2}\Delta\phi + V\phi,$$

Solução:  $\phi(t, x_1, x_2, \dots, x_n)$ .

- Equações de Navier-Stokes (Mecânica dos Fluidos):

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{v} &= 0 \\ \rho \left( \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) &= -\nabla p + \mu \Delta \mathbf{v} \end{aligned}$$

Solução:  $\mathbf{v}(t, x, y, z), p(t, x, y, z)$

- Equações de Einstein (Relatividade Geral):

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

Solução: Variedade lorentziana 4 dimensões (espaço-tempo) descrita pela métrica  $g_{\mu\nu}$

Teorema (Peano): Seja  $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$  um conjunto aberto e  $\mathbf{f} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  uma função contínua. Então, dado  $(t_0, \mathbf{y}_0) \in \Omega$ , existe solução do problema de valor inicial para a equação diferencial ordinária de primeira ordem

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}), \quad (t_0, \mathbf{y}_0).$$