

Análise Complexa e Equações Diferenciais

Problemas propostos para as aulas práticas

Semana 4 - 4 a 8 de Outubro de 2010

1. Calcule as derivadas das seguintes funções:

a) $\operatorname{sen}(z) + 3z^2 - ze^{z^3}$ b) $\cos(z) + (2z + 1)^z$ c) $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$

2. Mostre que $f(z) = \sqrt{|xy|}$ possui, na origem, derivadas parciais que verificam as equações de Cauchy-Riemann, mas que f não possui derivada (no sentido complexo) nesse ponto. Porque é que isso não contradiz o Teorema de Cauchy-Riemann?

3. Seja $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ definida por $f(z) = (|z|^2 - 2)\bar{z}$.

a) Determine o subconjunto de \mathbb{C} onde f é diferenciável, bem como o seu domínio de analiticidade.

b) Mostre que f transforma circunferências centradas na origem e de raio r em circunferências centradas na origem de raio r' . Para que valores de r se tem $r = r'$?

4. Seja $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ uma função holomorfa tal que se verifica uma das condições

a) $\operatorname{Re}(f)(z) \equiv (\text{constante})$,

b) $f'(z) \equiv 0$,

c) $|f(z)| \equiv (\text{constante})$.

Mostre que então $f(z) \equiv (\text{constante})$.

5. Mostre que se f e \bar{f} são ambas inteiras (i.e. diferenciáveis em todo o \mathbb{C}), então f é constante.

6. Seja $A \subset \mathbb{C}$ um aberto e defina $A^* = \{z \in \mathbb{C} : \bar{z} \in A\}$. Se f é uma função analítica em A mostre que $F(z) = \overline{f(\bar{z})}$ é uma função analítica em A^* .

7. Sabendo que, para $z = x + iy$, se tem $x = (z + \bar{z})/2$ e $y = (z - \bar{z})/2i$, dada uma função complexa $f(x, y) : D_f \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, diferenciável no sentido de \mathbb{R}^2 , podemos considerá-la como uma função de z e \bar{z} . Defina a derivada

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{1}{i} \frac{\partial f}{\partial y} \right),$$

e mostre que f satisfaz as equações de Cauchy-Riemann se e só se

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0.$$

Nota: este exercício mostra que as funções holomorfas são, neste sentido, aquelas que não dependem de \bar{z} .

8. Determine, pela definição, os valores dos seguintes integrais:
- $\int_C |z| dz$ em que C é a semicircunferência centrada na origem, percorrida em sentido directo, unindo $-2i$ a $2i$.
 - $\int_C \bar{z} dz$ em que C é o segmento de recta unindo 1 a $2 + 3i$.
 - $\int_C z \cos z^2 dz$ em que C é o segmento de recta unindo 0 a πi .
9. Considere o caminho γ_1 que consiste no segmento de recta unindo o ponto inicial 0 ao ponto final $\sqrt{2}e^{i\pi/4}$, e considere também o caminho γ_2 entre esses mesmos pontos dado pela parábola $t \mapsto t + it^2$.
- Calcule, utilizando a definição, $\int_{\gamma_k} e^z dz$, com $k = 1, 2$.
 - Calcule $\int_{\gamma_k} \bar{z}^2 dz$ com $k = 1, 2$.
 - Comente os resultados que obteve nas alíneas anteriores.
10. Calcule o integral $\int_{\gamma} \frac{1}{\sqrt{z}} dz$, onde γ é percorrida no sentido positivo e
- $\gamma = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1, \text{Im}(z) \geq 0\}$, e escolha-se o ramo da função \sqrt{z} que verifica $\sqrt{1} = 1$,
 - $\gamma = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1, \text{Re}(z) \geq 0\}$, e escolha-se o ramo da função \sqrt{z} que verifica $\sqrt{-i} = (1 - i)/\sqrt{2}$.
11. Seja
- $$f(z) = z^{-1+i} = \exp[(-1 + i)\log z] \quad , \quad |z| > 0 \text{ e } 0 < \arg z < 2\pi$$
- Calcule
- $$\oint_{|z|=1} f(z) dz$$
- onde a curva é percorrida no sentido positivo.
12. Seja $\gamma(t) = Re^{it}$ para $0 \leq t \leq \pi$. Mostre que se $R > 2$, então
- $$\left| \int_{\gamma} \frac{2z^2 - 1}{z^4 + 5z^2 + 4} dz \right| \leq \pi \frac{R(2R^2 + 1)}{(R^2 - 1)(R^2 - 4)}$$
13. Considere o caminho $z : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{C}$, definido por $z(\theta) = e^{-\theta+i\theta}$, que representa parametricamente a curva γ . Considere ainda $\alpha := \int_{\gamma} z dz$.
- Esboce γ .
 - Calcule α usando a definição.
 - Calcule α usando o Teorema Fundamental do Cálculo.
 - Calcule α usando o Teorema de Cauchy para substituir γ por um segmento de recta.
14. Seja γ uma curva fechada simples com orientação positiva. Usando o Teorema de Green, mostre que a área no interior de γ pode ser escrita na forma

$$\frac{1}{2i} \int_{\gamma} \bar{z} dz.$$