

Cálculo Diferencial e Integral - III

Problemas propostos

Semana 6 - 16 a 20 de Outubro de 2023

1. Para cada uma das seguintes equações diferenciais, esboce o campo de direcções e trace os respectivos tipos de soluções .

a) $y' = (2 - y)(y - 1)$, b) $y' = y(1 - y^2)$,

c) $y' = \operatorname{sen}(y - t)$, d) $y' = \frac{y+t}{y-t}$,

e) $y' = t^2 + y^2$, f) $y' = \frac{ty}{1+t^2}$.

2. Determine todas as soluções das seguintes equações diferenciais ordinárias lineares.

a) $\frac{dy}{dt} = \frac{ty}{1+t^2}$ b) $\frac{dy}{dt} = -ye^t$

c) $\frac{dy}{dx} + y = 2 + 2x$ d) $\psi' = \psi - t$

e) $x\frac{dy}{dx} + 2y = (x-2)e^x$ f) $\frac{di}{dt} - 6i = 10 \operatorname{sen}(2t)$

g) $\frac{dy}{dt} = y\left(\frac{1}{t} - \tan t\right) + t \cos t$ h) $(1+y^2)\frac{dx}{dy} = \arctan y - x$

3. Determine as soluções dos seguintes problemas de Cauchy

a) $xy' = 2y + x^3e^x$, $y(1) = 0$,

b) $\frac{dv}{du} + \frac{2u}{1+u^2}v - \frac{1}{1+u^2} = 0$, $v(0) = 1$.

c) $\begin{cases} x' + h(t)x - t = 0, \\ x(-1) = 2 \end{cases}$, com $h(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < 0 \\ t & \text{se } t \geq 0 \end{cases}$

4. De acordo com a lei de arrefecimento de Newton, a taxa de arrefecimento de uma substância numa corrente de ar, é proporcional à diferença entre a temperatura da substância e a do ar. Assumindo que a temperatura do ar é 30° e que a substância arrefece de 100° para 70° em 15m, determine o tempo que a substância demora a atingir a temperatura de 40° .

5. Dada a equação diferencial

$$\frac{dy}{dt} + a(t)y = f(t)$$

onde a e f são funções contínuas em \mathbb{R} que verificam

$$a(t) > c > 0 \quad \forall t, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = 0$$

Mostre que quaquer solução da equação diferencial satisfaz

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0.$$

6. Determine todas as soluções das seguintes equações diferenciais ordinárias

a) $x^3 + (y+1)^2 \frac{dy}{dx} = 0,$

b) $\varphi' = e^{\varphi-t},$

c) $xy + (1+x^2)y' = 0,$

d) $y' = 1-x+y^2-xy^2,$

e) $2ty^3 + 3t^2y^2y' = 0,$

f) $(1+t)\frac{dy}{dt} + \frac{y}{2} = (1+t)^{5/2}.$

7. Resolva o problema de Cauchy $\varphi(\theta)\varphi'(\theta) = \theta, \varphi(1) = \alpha$ e determine para que valores de α é que a solução está definida para todo o $\theta \in \mathbb{R}$.

8. Considere a equação diferencial separável $x' = x\operatorname{sen} t + x^2\operatorname{sen} t$. Determine a solução desta equação que satisfaz a condição inicial $x(\frac{\pi}{2}) = -2$, e determine o seu intervalo máximo de existência.