

## Aula 12

### Equações Diferenciais Ordinárias Escalares Lineares de 1<sup>a</sup> Ordem

$$\frac{dx}{dt} = a(t)x + b(t),$$

com  $a, b : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  contínuas em  $I$ .

## Equações Diferenciais Ordinárias Escalares

### Lineares de 1<sup>ª</sup> Ordem **homogéneas**

$$\frac{dx}{dt} = a(t)x,$$

com  $a : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  contínua em  $I$ .

A solução geral de uma equação diferencial ordinária, escalar de primeira ordem, linear e homogénea

$$\frac{dx}{dt} = a(t)x,$$

com  $a : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  contínua num intervalo  $I \subset \mathbb{R}$ , é dada por

$$x(t) = C e^{\int a(t)dt},$$

em que  $C \in \mathbb{R}$  é uma constante arbitrária.

A solução do problema de Cauchy, com condição inicial  $x(t_0) = x_0 \in \mathbb{R}$  em  $t_0 \in I$ , é dada por

$$x(t) = x_0 e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}.$$

Teorema: Dada uma equação diferencial ordinária, escalar de primeira ordem, linear

$$\frac{dx}{dt} = a(t)x + b(t),$$

com  $a, b : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  contínuas num intervalo  $I \subset \mathbb{R}$ , a solução geral é dada por

$$x(t) = \frac{C}{\mu(t)} + \frac{1}{\mu(t)} \int \mu(t)b(t)dt,$$

em que  $C \in \mathbb{R}$  é uma constante arbitrária e um factor integrante  $\mu(t) = e^{-\int a(t)dt}$ .

A solução do problema de Cauchy, com condição inicial  $x(t_0) = x_0 \in \mathbb{R}$  é dada por

$$\begin{aligned} x(t) &= x_0 \frac{\mu(t_0)}{\mu(t)} + \frac{1}{\mu(t)} \int_{t_0}^t \mu(s)b(s)ds \\ &= x_0 e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} + \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r)dr} b(s)ds. \end{aligned}$$