

Cálculo Diferencial e Integral - III

1º Semestre 2025/2026

1º TESTE - VERSÃO A

15 DE OUTUBRO DE 2025

CURSOS: LMAC E LEFT

INSTRUÇÕES

- As respostas devem ser escritas a caneta. Testes a lápis não permitem revisão de prova.
 - Não é permitida a utilização de quaisquer elementos de consulta nem de equipamentos electrónicos, incluindo máquinas de calcular
 - A utilização de telemóveis/smartphones é totalmente proibida. Devem estar desligados e arrumados durante toda a duração da prova.
 - Justifique as suas respostas e apresente todos os cálculos.
 - Classificação de 0 a 20.
 - Duração: 45 minutos.
-
-

1. Considere o campo vetorial $\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por $\mathbf{F}(x, y, z) = (1, -z, y)$.

[5,0 val] (a) Justifique que \mathbf{F} admite um potencial vetorial e determine um exemplo com a primeira componente nula.

[6,0 val] (b) Utilizando o teorema de Stokes, e o potencial da alínea anterior, determine o valor do fluxo de \mathbf{F} através de qualquer superfície com bordo no cilindro $y^2 + z^2 = 4$, da forma

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = \phi(y, z), \quad y^2 + z^2 \leq 4\},$$

com ϕ de classe C^1 , e normal unitária com primeira componente positiva, provando que esse valor é invariante, ou seja, que não depende de ϕ .

[5,0 val] (b') (Alternativa, caso não tenha conseguido determinar o potencial em (a)) Resolva a alínea anterior usando o teorema da divergência.

2. Considere o conjunto

$$M = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5 : x_1 - x_2^2 - x_5^2 = 0, \quad x_3 + x_2x_5 - x_4 = 0\}.$$

[2,0 val] (a) Prove que M é uma variedade e indique a sua dimensão d .

[2,0 val] (b) Indique uma parametrização (global) para M .

[3,0 val] (c) Determine os espaços tangente $T_p M$ e normal $N_p M = (T_p M)^\perp$ a M no ponto $p = (1, 0, 0, 0, 1)$, indicando uma base para cada um deles.

[2,0 val] (d) Determine o elemento de volume d -dimensional correspondente à parametrização escolhida em (b) no ponto $p = (1, 0, 0, 0, 1)$.