

ANÁLISE MATEMÁTICA II

2.º Exame: LEAN, LEBM, LEFT e LMAC

Campus da Alameda, 5 de Julho de 2006

I

[3,0] 1.

a) Calcule uma primitiva de cada uma das seguintes funções:

$$x\sqrt{1-x^2}, \quad \frac{e^{3x}}{3+e^{3x}}, \quad \frac{x}{4+x^4}.$$

b) Desenvolva em série de potências de x uma primitiva da última função considerada na alínea anterior, e indique o conjunto dos números reais para os quais a soma da série encontrada representa a respectiva função.

[2,5] 2. Calcule

$$\int_0^1 \frac{e^{2x} + e^x + 1}{(e^x + 1)^2} dx.$$

[1,5] 3. Determine a área da região plana delimitada pelo gráfico da função $\arccos x$, pela recta tangente ao gráfico da função $\arccos x$ no ponto $(0, \pi/2)$ e pela recta de equação cartesiana $y = 0$.

[2,5] 4. Considere uma função $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável. Calcule

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_x^{\arctan x} g(t) dt}{x^2}.$$

II

[3,0] 1. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe $C^2(\mathbb{R}^2)$ e $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$\varphi(x, y) = f(x^2 + y, x \sin y), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Mostre que

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}(0, \pi/2) - 2 \frac{\partial \varphi}{\partial y}(0, \pi/2) = \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(\pi/2, 0),$$

onde v designa a segunda variável de f .

- [3,0] 2. Seja $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma função diferenciável em $\mathbb{R}^2$ tal que $\phi(a, b) = (0, \pi/2)$ e $\phi'(a, b)$ é a aplicação linear L definida por

$$L(x, y) = (x + 2y, 3x - 4y), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

- a) Determine $\frac{\partial \phi}{\partial w}(a, b)$, onde $w = (1, 1/2)$.
 b) Sendo $h = \varphi \circ \phi$ (onde φ é a função definida em **II 1.**), calcule $h'(a, b)$.

III

- [2,5] 1. Considere a função definida por

$$f : \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy \geq 0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x, y) = x^4 y^7 (1 - x - y),$$

e o conjunto $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0 \wedge y \geq 0 \wedge x + y \leq 1\}$.

- a) Prove que a restrição de f ao conjunto A tem máximo e mínimo, respectivamente denotados por M e m . Determine m .
 b) Prove que M é máximo de f (e não apenas máximo da restrição de f ao conjunto A).
 c) Justifique que o contradomínio de f é o conjunto $] -\infty, M]$.

- [2,0] 2. Seja $f \in C^2(\mathbb{R})$ tal que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{x} = \alpha,$$

onde $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

- a) Prove que f tem um ponto de inflexão na origem.
 b) Supondo $\alpha \in \mathbb{R}$, mostre que a conclusão da alínea anterior é falsa.