

1º TESTE DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - Versão B
LMAC, MEFT, MEBIom, MEQ, MEBiol, MEAmbi, LEAN, LEMat

1º Sem. 2012/13 10/11/2012 Duração: 1h30m

1. (3,0 val.)

- (i) Represente na forma de um intervalo ou de uma união disjunta de intervalos cada um dos conjuntos seguintes:

$$A = \{x \in \mathbb{R} : |x - 2| < |x + 1|\}, \quad B = \{e^{-x}, x \in [1/2, +\infty[\}.$$

- (ii) Indique, caso existam em \mathbb{R} , o supremo, ínfimo, máximo e mínimo do conjunto:

$$C = \left\{ \log \left(1 + \frac{(-1)^n}{n+1} \right), n \in \mathbb{N} \right\}.$$

2. (2,0 val.)

Recorrendo ao método de indução mostre que a derivada de ordem n da função xe^{3x} verifica:

$$(xe^{3x})^{(n)} = (3^n x + n3^{n-1})e^{3x}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

3. (2,0 val) Calcule a derivada das funções definidas pelas seguintes expressões:

$$\frac{\cosh(x^2)}{\sqrt{e^x + 1}}, \quad \arctan(x^{\frac{5}{2}}).$$

4. (4,0 val.) Calcule os seguintes limites (caso existam em $\overline{\mathbb{R}}$):

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^{\sqrt{x}} - 1)^2}{2x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \sin x)^{\frac{1}{\log x}}, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} (x - 2) \log(x^2 - 4).$$

5. (6,0 val.) Considere a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida pela expressão:

$$f(x) = |x|e^{-x(x-1)}.$$

- (i) Determine o domínio de diferenciabilidade de f e calcule f' .
(ii) Estude f quanto a monotonia e extremos.
(iii) Indique, justificando, se f tem máximo e mínimo absolutos.
(iv) Justifique que f restringida ao intervalo $]1, +\infty[$ é invertível e indique o domínio da respectiva função inversa. Calcule a derivada da função inversa no ponto $f(2)$.

6. (3,0 val.)

- (i) Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que a imagem $f(\mathbb{R}) = \{b_1, \dots, b_p\}$ é um conjunto finito. Prove que se f é contínua em $a \in \mathbb{R}$, então f é constante numa vizinhança de a .
(ii) Considere a função $g : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = x^2 \arctan \left(1 + \sin \frac{1}{x} \right)$. Prove que a função g' tem infinitos zeros em $]0, \frac{2}{3\pi}[$. Sugestão: utilize o teorema de Rolle em intervalos adequados.