

**11<sup>a</sup> ficha de exercícios para as aulas práticas**

1. Determine um produto interno em  $\mathbb{R}^2$  tal que  $\langle(1, 0), (0, 1)\rangle = 2$ .
2. Considere o produto interno usual. Sejam

$$U = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x + z + w = 0 \quad \text{e} \quad x + y + z + w = 0\}$$

e

$$V = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x - z = 0 \quad \text{e} \quad x - w = 0\}.$$

- a) Determine, justificando, uma base ortogonal para  $U^\perp$ .
- b) Calcule, justificando, a distância entre  $(1, 1, 1, 1)$  e  $U$ .
- c) Determine  $u \in U$  e  $v \in V$  tais que

$$(1, 0, 0, 0) = u + v.$$

3. Considere o produto interno usual em  $\mathbb{R}^3$  e os seguintes planos:

$$U = \{(0, -1, 1)\} + L(\{(1, 0, 0), (0, 1, 1)\}), \quad V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y - z = 0\}.$$

Determine, justificando, uma base ortogonal para  $\mathbb{R}^3$  que inclua um vetor de  $V^\perp$  e calcule, justificando, a distância entre  $U$  e  $V$ .

4. Considere em  $\mathbb{R}^3$  o produto interno para o qual a base ordenada de  $\mathbb{R}^3$ :

$$\{(1, 0, -1), (0, 1, 0), (-1, 0, 2)\}$$

é ortonormada. Verifique que esse produto interno é definido pela aplicação  $\langle , \rangle : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  dada por:

$$\langle(x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)\rangle = 5x_1y_1 + 3x_1y_3 + x_2y_2 + 3x_3y_1 + 2x_3y_3$$

e determine, relativamente a ele, uma base para  $(L(\{(-2, 0, 3), (0, 1, 0)\}))^\perp$ .

5. Considere  $P_2$  a aplicação  $\langle , \rangle : P_2 \times P_2 \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$\langle p(t), q(t)\rangle = p(-1)q(-1) + p(0)q(0) + p(1)q(1).$$

Considere também o seguinte subespaço de  $P_2$ :  $U = \{p(t) \in P_2 : p(0) = 0\}$ .

- (i) Verifique que  $\langle , \rangle$  define um produto interno em  $P_2$ .
- (ii) Determine uma base ortonormada para  $U^\perp$ .
- (iii) Determine a distância entre  $1 + t$  e  $U$ .

6. Considere o produto interno  $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  definido por

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(AB^T).$$

Considere também o seguinte subespaço de  $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ :

$$U = \{A \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : A = A^T\}.$$

**(i)** Determine uma base ortonormada para  $U$ .

**(ii)** Determine as projecções ortogonais da matriz  $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  sobre  $U$  e  $U^\perp$  respectivamente.

**(iii)** Qual é a matriz simétrica mais próxima da matriz  $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ?

**(iv)** Determine a distância entre  $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  e  $U$ .

7. Considere o espaço linear  $\mathbb{R}^4$  munido com o produto interno usual e os seguintes subespaços lineares de  $\mathbb{R}^4$ :

$$V = L(\{(1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, -1)\}), \quad W = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x - y + 2z + 3w = 0\}.$$

**a)** Determine  $u \in V$  e  $v \in V^\perp$  tais que  $(2, -2, 1, -1) = u + v$  e calcule  $d((1, 1, 1, 1), V)$ .

**b)** Encontre uma matriz  $A$  tal que  $W^\perp = \mathcal{N}(A)$ .

**c)** Verifique que  $V \subset W$  e determine uma base para  $W^\perp \cap V^\perp$ .

**d)** Verifique se  $V^\perp + W^\perp = \mathbb{R}^4$ , justificando.

8. Considere o espaço linear  $\mathbb{R}^4$  munido com o produto interno usual e os seguintes subespaços lineares de  $\mathbb{R}^4$ :

$$U = L(\{(0, 1, 1, 1), (1, -1, 1, 0)\}), \quad V = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : 4x + 3y + 2z + w = 0\}.$$

**a)** Determine uma base ortogonal para  $V^\perp$ .

**b)** Determine a distância entre o ponto  $(1, 2, 3, 4)$  e o subespaço  $V^\perp$ .

**c)** Determine uma base ortogonal para  $\mathbb{R}^4$  que inclua os vectores  $(0, 1, 1, 1)$  e  $(1, -1, 1, 0)$ .

**d)** Encontre uma matriz  $A$  tal que  $U = (\mathcal{C}(A))^\perp$ .

9. Seja

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 2y - 3z = 0\}.$$

Considere o produto interno usual.

**a)** Determine as equações cartesianas da recta que passa pelo ponto  $u = (1, 1, 1)$  e é ortogonal ao plano  $W$ .

**b)** Determine a equação cartesiana do plano que passa pelo ponto  $u = (1, 1, 1)$  e é paralelo ao plano  $W$ .

10. Considere o produto interno usual em  $\mathbb{R}^3$  e a transformação linear  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  definida por  $T(x, y, z) = (0, x + y, z)$ . Determine os valores próprios de  $T$  e diga se  $T$  é uma projecção ortogonal.