

Análise Matemática IV

LEAN, LEBI, LEQ, LQ

2º Semestre de 2003/04

Problemas para a aula prática

7ª Semana

1. Determine a solução geral das seguintes equações diferenciais, indicando os intervalos de definição das funções.

a) $\frac{dy}{dt} = \frac{1}{1+t^2}$

b) $x' = -tx$

c) $\frac{dy}{dt} + y \cos t = 0$

d) $\psi' = \psi - t$

e) $\frac{dy}{dt} - y \sin t = e^{-\cos t}$

f) $g'(t) = 2t g(t) + t$

g) $w' = \frac{2t}{1+t^2}w + t^2 - 1$

2. Determine a solução do seguintes problemas de valor inicial, indicando os intervalos máximos de definição:

a) $\frac{dy}{dt} + \sqrt{1-t^2} y = 0, y(0) = e^5.$

b) $L \frac{di}{dt} + Ri = V \sin t, i(0) = 0.$

c) $x' = 2tx + t, x(0) = 1.$

d) $x' + h(t)x - t = 0, x(-1) = 2, \text{ com } h(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < 0 \\ t & \text{se } t \geq 0 \end{cases}.$

3. Determine a solução geral da seguinte equação diferencial:

$$(1+t) \frac{dy}{dt} + \frac{y}{2} = (1+t)^{\frac{5}{2}}.$$

4. Num dado instante vivem, numa determinada floresta, mil coelhos. Sabendo que a taxa de natalidade dos coelhos é de 2% por dia e a taxa de mortalidade é de 1% por dia, determine ao fim de quanto tempo a população dos coelhos duplica.
5. Num reservatório contendo um quilolitro de água é introduzido um resíduo industrial a um caudal de um litro por minuto. A mistura é instantaneamente homogeneizada e despejada do reservatório à mesma taxa. Determine a concentração do resíduo no reservatório ao fim de T minutos e calcule quanto tempo é necessário decorrer até a concentração do resíduo atingir 20%.

6. Determine todas as soluções das seguintes equações diferenciais ordinárias

a) $u' = \frac{1}{2}(u^2 - 1)$.

b) $\varphi' = e^{\varphi-t}$.

c) $y' = 1 - x + y^2 - xy^2$.

7. Nas alíneas seguintes determine a solução do problema de Cauchy e o intervalo de existência de cada solução :

a) $\cos y \frac{dy}{dt} = \frac{-t \operatorname{sen} y}{1+t^2}$, $y(1) = \frac{3\pi}{4}$.

b) $\frac{dy}{dt} = \frac{2t}{y-yt^2}$, $y(2) = 3$.

8. Resolva o seguinte problema de valor inicial

$$\begin{cases} y(t)y'(t) = t \\ y(1) = \alpha \end{cases}$$

e diga para que valores de α é que a solução está definida para todo o $t \in \mathbb{R}$.

9. Resolva os seguintes problemas de valor inicial indicando o intervalo máximo de definição da solução obtida:

a) $y' + \frac{t}{t^2+2}y = 2t$, com $y(1) = 2$.

b) $2t + e^{t^2} \cos y y' = 0$, com $y(0) = 2\pi$.

10. Determine $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$, onde a função $y(t)$ é solução do problema

$$y' = \frac{t - 2t^2}{7y^6 + 3y^2 + 1} \quad \text{com} \quad y(0) = 0.$$