

# Análise Matemática IV

## LEC

2º Semestre de 2005/06

Problemas para a aula prática

### 7ª Semana

1. Determine a solução geral das seguintes equações diferenciais, indicando os intervalos de definição das funções.

a)  $\frac{dy}{dt} = \frac{1}{1+t^2}$

b)  $x' = -tx$

c)  $\frac{dy}{dt} + y \cos t = 0$

d)  $\psi' = \psi - t$

e)  $\frac{dy}{dt} - y \sin t = e^{-\cos t}$

f)  $g'(t) = 2t g(t) + t$

g)  $w' = \frac{2t}{1+t^2} w + t^2 - 1$

2. Determine a solução do seguintes problemas de valor inicial, indicando os intervalos máximos de definição:

a)  $\frac{dy}{dt} + \sqrt{1-t^2} y = 0, y(0) = e^5.$

b)  $L \frac{di}{dt} + Ri = V \sin t, i(0) = 0.$

c)  $x' = 2tx + t, x(0) = 1.$

d)  $x' + h(t)x - t = 0, x(-1) = 2, \text{ com } h(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < 0 \\ t & \text{se } t \geq 0 \end{cases}.$

3. Determine a solução geral da seguinte equação diferencial:

$$(1+t) \frac{dy}{dt} + \frac{y}{2} = (1+t)^{\frac{5}{2}}.$$

4. O modelo mais simples para evaporação de uma gota de água esférica é supor que a diminuição de volume da gota se processa a uma taxa proporcional à sua superfície.

- a) Qual o tempo necessário para que uma gota de raio  $R_0$  se evapore completamente?
- b) Se supusermos que a taxa de diminuição de volume da gota é proporcional ao *quadrado* da sua superfície, quanto tempo demora uma gota de raio  $R_0$  a evaporar-se completamente?

5. Num reservatório contendo um quilolitro de água é introduzido um resíduo industrial a um caudal de um litro por minuto. A mistura é instantaneamente homogeneizada e despejada do reservatório à mesma taxa. Determine a concentração do resíduo no reservatório ao fim de  $T$  minutos e calcule quanto tempo é necessário decorrer até a concentração do resíduo atingir 20%.

6. Determine todas as soluções das seguintes equações diferenciais ordinárias

a)  $u' = \frac{1}{2}(u^2 - 1)$ .

b)  $\varphi' = e^{\varphi-t}$ .

c)  $y' = 1 - x + y^2 - xy^2$ .

7. Nas alíneas seguintes determine a solução do problema de Cauchy e o intervalo máximo de existência de cada solução :

a)  $\cos y \frac{dy}{dt} = \frac{-t \operatorname{sen} y}{1+t^2}$ ,  $y(1) = \frac{3\pi}{4}$ .

b)  $\frac{dy}{dt} = \frac{2t}{y - yt^2}$ ,  $y(2) = 3$ .

c)  $\frac{dy}{dt} = \frac{2t \log(1+t^2)}{\cos y}$ ,  $y(0) = \pi$ .

d)  $\frac{dy}{dt} = \sqrt{1-y^2}$ ,  $y(0) = 0$ .

8. Resolva o seguinte problema de valor inicial

$$\begin{cases} y(t)y'(t) = t \\ y(1) = \alpha \end{cases}$$

e diga para que valores de  $\alpha$  é que a solução está definida para todo o  $t \in \mathbb{R}$ .

9. Resolva os seguintes problemas de valor inicial indicando o intervalo máximo de definição da solução obtida:

a)  $y' + \frac{t}{t^2+2}y = 2t$ , com  $y(1) = 2$ .

b)  $2t + e^{t^2} \cos y y' = 0$ , com  $y(0) = 2\pi$ .

10. Determine  $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$ , onde a função  $y(t)$  é solução do problema

$$y' = \frac{t - 2t^2}{7y^6 + 3y^2 + 1} \quad \text{com} \quad y(0) = 0.$$